

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

20 maart 2015

Actueel WG van het middel DuPont LEXUS SX, 14734 N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden:

Toepassings-Gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
wintertarwe	Voor opkomst, na opkomst	Duist ¹ en windhalm ²	20 g/ha	1
	Na opkomst in het voorjaar	Eénjarige breedbladige onkruiden		

¹duist (*Alopecurus myosuroides*),

²windhalm (*Apera spica-venti*)

Toepassingsvoorwaarden

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in perceelsstroken die grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 m vanaf de insteek van de sloot gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% drift reducerende spuitdoppen.

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in perceelsstroken die niet grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 m van het gewas, gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij, gebruik wordt gemaakt van één van de volgende maatregelen:

- *driftarme spuitdoppen,*
- *standaard spuitdoppen in combinatie met luchtondersteuning.*

Ondervruchten

Het wordt afgeraden DuPont LEXUS[®] SX toe te passen in een gewas waar grassen of klaver zijn gezaaid als ondervrucht. Deze zijn namelijk zeer gevoelig voor het middel.

Volggewassen

Na de toepassing van DuPont LEXUS[®] SX kunnen na de oogst (en na ploegen) de volgende gewassen veilig geteeld worden:

in de herfst :

- na 4 maanden: wintergranen, grassen en winterkoolzaad;

in het volgende voorjaar :

- na 10 maanden: granen, maïs, aardappelen, bieten en vlas.

Met andere gewassen is slechts beperkt ervaring opgedaan.

Mislukking teelt

Indien binnen drie maanden na de toepassing opnieuw een gewas ingezaaid moet worden vanwege het mislukken van de teelt dan komt alleen tarwe in aanmerking als vervangend gewas. Het middel mag in dat geval niet weer worden toegepast.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof flupyrsulfuron-methyl. Flupyrsulfuron-methyl behoort tot de sulfonyleureumverbindingen. De Hrac code is B. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

