

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassings-Gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappelen	Aardappelziekte ¹ Alternaria ²	2,0 kg/ha	8	10 (voor het sluiten van het gewas)	7
				7 (na sluiten van het gewas- BBCH 40)	
Sla (<i>Lactuca spp.</i> ; onbedekt teelt)	Valse meeldauw ³	2,2 kg/ha	3	7	14
Uien	Valse meeldauw ⁴	2,5 kg/ha	4	12 (voor begin bolvorming-BBCH) 40)	14
				7 (vanaf begin bolvorming-BBCH) 40)	
Sjalotten	Valse meeldauw ⁴	2,5 kg/ha	4	12 (voor begin bolvorming-BBCH) 40)	14
				7 (vanaf begin bolvorming-BBCH) 40)	

Toepassings- Gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Aardappelziekte (*Phytophthora infestans*)

² Alternaria (*Alternaria solani*)

³ Valse meeldauw (*Bremia lactucae*)

⁴ Valse meeldauw (*Peronospora destructor*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van aardappelen, uien en sjalotten het middel toepassen met 200 tot 400 L water/ha.

Om de vogels te beschermen is toepassing in teelt van aardappelen voor BBCH 40 (sluiting van het gewas), uitsluitend toegestaan indien een interval van ten minste 10 dagen tussen de toepassingen in acht wordt genomen.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in de teelt van sla (*Lactuca spp.*) in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om de vogels en zoogdieren te beschermen is toepassing in de teelt van uien en sjalotten voor BBCH 40 (wanneer bolvorming begint) uitsluitend toegestaan indien een interval van ten minste 12 dagen tussen de toepassingen in acht wordt genomen.

Om residuen boven de MRL in volggewassen te voorkomen, is een wachttermijn vereist van tenminste 120 dagen tussen laatste toepassing en zaaien of planten. Dit geldt voor alle volggewassen waarvoor een MRL lager dan 0,05 mg/kg geldt, met uitzondering van granen, waarvoor geen

wachttermijn is vereist.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof dimethomorf. Dimethomorf behoort tot de cinnamic zuren. De FRAC code is 40. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

-