

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 12 december 2014 tot afgeleide toelating van het middel Klaverblad Ultra Glyphosaat, toelatingnummer 14699 N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als:

- onkruidbestrijdingsmiddel
- doodspuitmiddel
- middel voor de behandeling van uitlopers van bomen en struiken
- middel voor de behandeling van stobben van afgezaagde bomen en struiken

in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juli 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheids-termijn in dagen
wintertarwe	op afgerijpt gewas (BBCH 85)	Onkruid	3-4 l/ha	4 l/ha	1x per teeltcyclus	7
Wintergerst	op afgerijpt gewas (BBCH 85)	Onkruid	3-4 l/ha	4 l/ha	1x per teeltcyclus	7
Winterrogge	op afgerijpt gewas (BBCH 85)	Onkruid	3-4 l/ha	4 l/ha	1x per teeltcyclus	7
Triticale	op afgerijpt gewas (BBCH 85)	Onkruid	3-4 l/ha	4 l/ha	1x per teeltcyclus	7
Spelt	op afgerijpt gewas (BBCH 85)	Onkruid	3-4 l/ha	4 l/ha	1x per teeltcyclus	7

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheids-termijn in dagen
Zomertarwe	op afgerijpt gewas (BBCH 85)	Onkruid	3-4 l/ha	4 l/ha	1x per teeltcyclus	7
Zomergerst	op afgerijpt gewas (BBCH 85)	Onkruid	3-4 l/ha	4 l/ha	1x per teeltcyclus	7
Haver	op afgerijpt gewas (BBCH 85)	Onkruid	3-4 l/ha	4 l/ha	1x per teeltcyclus	7
Peulvruchten	op afgerijpt gewas (BBCH 85)	Onkruid	3-4 l/ha	4 l/ha	1x per teeltcyclus	7
voedergrasland, waarin geen vee aanwezig is	doodspuiten	gras en onkruid	4-7 l/ha	7 l/ha	1x per 12 maanden	5
Gazon	doodspuiten	gras en onkruid	4-7 l/ha	7 l/ha	1x per 12 maanden	-
Sportveld	doodspuiten	gras en onkruid	4-7 l/ha	7 l/ha	1x per 12 maanden	-
Kerstbomen	over het gewas	kweek ¹	4 l/ha	4 l/ha	1x per 12 maanden	-
		distel, brandnetel en varens ²	6 l/ha	6 l/ha		
tijdelijk onbeteeld terrein en onverhard permanent onbeteeld terrein	-	Eenjarige onkruiden	2-4 l/ha	4 L/ha	1x per 12 maanden	7
		Kweek en zuring ³	4 L/ha	4 L/ha		
		Distel, bijvoet, boterbloem, weegbree, brandnetel, basterdwederik, wilgenroosje, samengesteld bloemige onkruiden, barmen en varens ⁴	6 l/ha	6 L/ha		

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheids-termijn in dagen
		Berenklauw, akkermelkdistel, akkerwinde, haagwinde en klein hoefblad ⁵	7-8 l/ha	8 l/ha		
		Japane duizendknoop ⁶	9-10 l/ha	10 L/ha		
tijdelijk onbeteeld terrein en onverhard permanent onbeteeld terrein	aanstrijken of pleksgewijs	scheuten van uitlopers van bomen of struiken	1,2% (12 ml in 1 liter water)	6 l/ha	1x per 12 maanden	7
tijdelijk onbeteeld terrein en onverhard permanent onbeteeld terrein	aanstrijken	stronken	2% (20 ml in 1 liter water)	10 l/ha	1x per 12 maanden	7
akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen	aanstrijken	Onkruid ⁷	35-55% (350-550 ml in 1 l water)	6 l/ha	1x per 12 maanden	-

¹ *Agropyrens repens*

² *Cirsium* spp., *Carduus* spp *Urtica* spp. en *Filicopsida* spp.

³ *Agropyrens repens* en *Rumex* spp.

⁴ *Artemisia vulgaris*, *Carduus* spp., *Chamerion angustifoliu*, *Cirsium* spp., *Epilobium adnatum*, *Filicopsida* spp., *Plantago* spp., *Ranunculus* spp., *Rubus fruticosus* en *Urtica* spp.

⁵ *Convolvulus arvensis*, *Convolvulus sepium*, *Heracleum sphondylium*, *Sonchus arvensi* en *Tussilago farfara*.

⁶ *Polygonum cuspidatum*

⁷ Met behulp van onkruidstrijkers, mits de toepassing zodanig plaatsvindt dat het gewas niet wordt geraakt met het middel, de apparatuur niet druipt en de vloeistof niet van de behandelde onkruiden afloopt.

Toepassingsvoorwaarden

Het product mag niet worden gebruikt op gewassen voor zaadproductie.

Dit middel mag niet worden toegepast op open, halfopen en gesloten verhardingen.

Bij de toepassing op tijdelijk onbeteeld terrein mogen sloottaluds niet gespoten worden.

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

In kerstbomen geldt dat het gewas tenminste 2 jaar oud moet zijn.

Bij toepassing op voedergrasland, waarin geen vee aanwezig is, een termijn van 5 dagen aanhouden voor beweiden of inkuilen.

Bij toepassing op tijdelijk onbeteeld terrein en onverhard permanent onbeteeld terrein een termijn van 7 dagen aanhouden voor uitzaai of planten.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, spelt, zomertarwe, zomergerst, haver, peulvruchten, voedergrasland, gazons en sportvelden uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing op tijdelijk onbeteeld terrein en onverhard permanent onbeteeld terrein uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing in de teelt van kerstbomen uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van andere technieken dan de Agricult LVS techniek (zoals standaard spuittechnieken met of zonder driftreducerende doppen en afgeschermd spuiten) in combinatie met een teeltvrije zone van 5 meter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij).