

**BIJLAGE I** bij het besluit d.d. 2 augustus 2013 tot toelating van het middel TEBUCUR 250 EW, toelatingnummer 14138 N.

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassing en per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassing en in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Wintertarwe	Aarfusarium <sup>1</sup>	1 L/ha	1	1	-	35 dagen
Winter- en zomergerst	Aarfusarium <sup>1</sup>	0,75-1 L/ha	1	1	-	35 dagen
Koolzaad	Phoma <sup>2</sup>	1 L/ha	2	2	21	56 dagen
	Spikkelziekte <sup>3</sup> , Rattenkeutelziekte <sup>4</sup>	1 L/ha	1		-	56 dagen

<sup>1</sup> Aarfusarium (*Fusarium* spp.)

<sup>2</sup> Phoma (*Phoma lingam*)

<sup>3</sup> Spikkelziekte (*Alternaria brassicae*)

<sup>4</sup> Rattenkeutelziekte (*Sclerotinia sclerotiorum*)

**Toepassingsvoorwaarden**

**Resistentiemanagement**

Dit middel bevat de werkzame stof tebuconazool. Tebuconazool behoort tot de triazolen. De Frac code is 3.

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

*Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van wintertarwe, winter- en zomergerst uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.*

*Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de teelt van koolzaad uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.*