

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 7 oktober 2013 tot uitbreiding van de toelating van het middel KENOCOX, toelatingnummer 13714 N

A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van

- bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), gisten en virussen in dierverblijfplaatsen en bijhorende ruimten, met uitzondering van transportmiddelen voor dieren en met uitzondering van legbatterijen voor pluimvee met beluchting (riemdrogen);
- Oöcysten van *Eimeria tenella* in dierverblijfplaatsen van pluimvee, met uitzondering van legbatterijen met beluchting (riemdrogen);
- Oöcysten van *Cryptosporidium parvum* in dierverblijfplaatsen van kalveren.

De dosering en inwerktijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden.

Om bodem- en in het water levende organismen te beschermen dienen resten die het middel bevatten te worden afgevoerd naar de mestopslag.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B. GEBRUIKSAANWIJZING

Voor werking tegen bacteriën, gisten en virussen:

1. Volg de gewone reinigingsprocedure, gebruik makend van bijvoorbeeld een alkalische reiniger.
2. Laat drogen.
3. Verdun KENOCOX met water tot een homogene oplossing.
Dosering voor het bestrijden van bacteriën en gisten: 0.25% (=2.5 ml KENOCOX met water aanvullen tot 1 L)
Dosering voor het bestrijden van virussen: 1% (=10 ml KENOCOX met water aanvullen tot 1 L)
4. Spray alle oppervlakken voldoende met de gebruiksooplossing van KENOCOX oplossing totdat de oppervlakken nat zijn (0.4 L gebruiksooplossing / m²).
5. Sluit de deuren en laat inwerken met een minimum inwerktijd van 30 minuten. Breng zoveel gebruiksooplossing aan dat de behandelde oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven.

Voor bestrijding van oöcysten van *Eimeria tenella* in dierverblijfplaatsen van pluimvee, met uitzondering van legbatterijen met beluchting (riemdrogen) en oöcysten van *Cryptosporidium parvum* in dierverblijfplaatsen van kalveren:

1. Volg de gewone reinigings- en desinfectie procedure, gebruik makend van bijvoorbeeld een alkalische reiniger en vervolgens desinfecteren.
2. Laat drogen.
3. Verdun KENOCOX met water tot een homogene oplossing. Dosering: 4% (=40 ml KENOCOX met water aanvullen tot 1 L).
4. Spray de oppervlakken (vloeren en muren) met de gebruiksooplossing van KENOCOX totdat de vloer nat is (0.4 L gebruiksooplossing / m²). Vergeet gaten en scheuren in vloeren en muren niet. Spray alle oppervlakken die in contact kunnen komen met dieren.
5. Sluit de deuren en laat inwerken met een minimum inwerktijd van 2 uur. Breng zoveel gebruiksooplossing aan dat de behandelde oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven.

N.B.:

- Het middel niet in direct contact met dieren laten komen
- Het spoelwater niet in het oppervlaktewater laten komen
- KENOCOX wordt aangebracht met een rugspuit
- De verdunning wordt aangemaakt met behulp van een automatisch doseersysteem
- Draag masker (minimum FFP2) en ondoordringbare beschermende kledij (incl. handschoenen).