

Actueel WG van het middel Lentagran WP, 12915 N

23 oktober 2020

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

W.7

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Sluitkoolachtigen	Na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1 per 12 maanden	2 kg/ha per 12 maanden	-	42
			1 kg/ha	2 per 12 maanden		7	
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	Na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1 per 12 maanden	2 kg/ha per 12 maanden	-	42
			1 kg/ha	2 per 12 maanden		7	
Boerenkool	Na uitplanten/ na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1 per teeltcyclus	2 kg/ha per teeltcyclus	-	42
			1 kg/ha	2 per teeltcyclus		7	
Zaaiui	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,5 kg/ha	4 per teeltcyclus	1,5 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Eerstejaars plantui	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,5 kg/ha	4 per teeltcyclus	1,5 kg/ha per teeltcyclus	5	56

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Tweedejaars plantui	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,5 kg/ha	4 per teeltcyclus	1,5 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Sjalotten	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,5 kg/ha	4 per teeltcyclus	1,5 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Prei	Na planten/na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1 per 12 maanden	2 kg/ha per 12 maanden	-	28
			1 kg/ha	2 per 12 maanden		7	

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Het gebruik in de teelt van onbedekte teelt van lupine, blauwmaanzaad, koolzaad, klaver, luzerne, koolrabi, schorseneer, zilverui, picklers, bosuien, knoflook, suikermaïs, maggiplant, valeriaan en gladiool, is op basis van een “derdenuitbreiding” en beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door Belchim Crop Protection nv/sa. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Lupine (Peulvrucht)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per teeltcyclus	7	-
Blauwmaanzaad (Oliehoudende zaden)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per teeltcyclus	7	-
Koolzaad (Oliehoudende zaden)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per teeltcyclus	7	-
Klaver (Voedergewassen)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per teeltcyclus	7	28
Luzerne (Voedergewassen)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per teeltcyclus	7	28
Koolrabi	Na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,65 kg/ha	1	1,65kg/ha per 12 maanden	-	42
Schorseneer	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 kg/ha	3	1,5 kg/ha per teeltcyclus	7	56
Zilverui	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,5 kg/ha	5**	2 kg/ha per teeltcyclus	5	56

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Picklers	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,5 kg/ha	5**	2 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Bosuien (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,5 kg/ha	5**	2 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Knoflook	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,5 kg/ha	5**	2 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Suikermaïs	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1	2 kg/ha per teeltcyclus	-	-
Maggiplant (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per 12 maanden	7	-
Valeriaan (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 kg/ha	3	1,5 kg/ha per teeltcyclus	14	56
Gladiool (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,5 kg/ha	5**	2 kg/ha per teeltcyclus	5	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

** Maximaal 2 keer toepassen met 0,25 kg/ha en 3 keer met 0,5 kg/ha.

Overige toepassingsvoorwaarden

De spuitvloeistof roeren tijdens bereiding en gebruik.

Het middel toepassen in 200-400 liter water per ha.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om het grondwater te beschermen mag dit middel of andere middelen die pyridaat bevatten slechts gedurende één jaar in een periode van drie jaar op hetzelfde perceel worden toegepast in de teelt van:

- *prei*
- *luzerne*
- *klaver*
- *suikermais*
- *schorseneer*

Om het grondwater te beschermen mag dit middel of andere middelen die pyridaat bevatten slechts gedurende één jaar in een periode van twee jaar op hetzelfde perceel worden toegepast in de teelt van:

- *sluitkoolachtigen*
- *bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)*
- *boerenkool*
- *zaaiui*
- *eerstejaars plantui*
- *tweedejaars plantui*
- *sjalotten*
- *lupine*
- *blauwmaanzaad*
- *koolzaad*
- *koolrabi*
- *zilverui*
- *picklers*
- *bosuien (onbedekte teelt)*
- *knoflook*
- *maggiplant (onbedekte teelt)*

- *valeriaan (onbedekte teelt)*
- *gladiool (onbedekte teelt)*

Om zoogdieren te beschermen is de toepassing in de teelt van lupine, klaver en luzerne uitsluitend toegestaan vanaf het derde blad stadium tot aan het begin ontwikkeling van bloeiwijze (BBCH 13-39).

In koolgewassen kan er kort na toediening enige gewasschade ontstaan. Dit verschijnsel is van voorbijgaande aard en leidt niet tot opbrengstderving en/of kwaliteitsverlies.

Ter voorkoming van gewasschade dienen de onderstaande toepassingstijdstippen in acht te worden genomen:

- In ter plaatse gezaaide kool het middel toepassen na opkomst van het gewas vanaf het 4 tot 6 bladstadium van het gewas. In geplante kool het middel 2 tot 4 weken na het uitplanten toepassen als het gewas goed is aangeslagen en tenminste 4 bladeren heeft ontwikkeld.
- In uien toepassen na het vlagbladstadium in een LDS-systeem op een afgehard gewas. Vanaf het 2 bladstadium van het gewas bespuitingen uitvoeren.
- In prei toepassen na opkomst (vanaf het 2 tot 3 bladstadium) of na het uitplanten.