

26 februari 2016

Minstrel 200 EC, toelatingnummer 14483 N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0 Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings- gebied	Type Toe- passing	Te bestrijden organisme	Do- se- ring (mid- del) per toe- pas- sing	Maxi- male do- sering (middel) per toe- passing	Maximaal aantal toepas- singen per teelt- cyclus of per 12 maanden	Veiligheids- termijn in dagen
Wintertarwe	Na opkomst	breedbladige onkruiden	1-2 l/ha	2 l/ha	1 per teeltcyclus	-
Wintergerst	Na opkomst	breedbladige onkruiden	1-2 l/ha	2 l/ha	1 per teeltcyclus	-
Winterrogge	Na opkomst	breedbladige onkruiden	1-2 l/ha	2 l/ha	1 per teeltcyclus	-
Triticale	Na opkomst	breedbladige onkruiden	1-2 l/ha	2 l/ha	1 per teeltcyclus	-
Zomertarwe	Na opkomst	breedbladige onkruiden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	1 per teeltcyclus	-
Zomergerst	Na opkomst	breedbladige onkruiden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	1 per teeltcyclus	-
Zomerrogge	Na opkomst	breedbladige onkruiden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	1 per teeltcyclus	-
Haver	Na opkomst	breedbladige onkruiden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	1 per teeltcyclus	-
Snijmais	Na opkomst	breedbladige onkruiden	1 l/ha	1 l/ha	1 per teeltcyclus	-
Voedergrasland	over het gewas	breedbladige onkruiden	0,75 - 2 l/ha ¹	2 l/ha	1 per 12 maanden	3 dagen tussen toepassing en beweiding of maaien
	pleksgewijs	breedbladige onkruiden	30 ml in 10 l water	0,1 l/ha ²		

¹ Pas ingezaaid grasland: 0,75 l/ha. Bestaand grasland: 2 l/ha

² Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden

Minstrel 200 EC toepassen in 150-400 liter water per ha in granen, in 200-300 liter water per ha in snijmais, in 200-400 liter water per ha in pas ingezaaid grasland en in 300-400 liter water per ha in bestaand grasland.

Toepassingsvoorwaarden

Stro van behandeld graan niet onderwerken in de grond maar verwijderen van het land en alleen gebruiken om te strooien onder vee.

Geen klaver, erwten, bonen en andere vlinderbloemigen inzaaien binnen 12 maanden na een toepassing met Minstrel in een dosering van 2 l middel per ha.

Restrictiezinnen

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is toepassing in de teelt van zomertarwe, zomergerst, zomerrogge, haver en nieuw ingezaaid grasland uitsluitend toegestaan wanneer er gebruik wordt gemaakt van 75% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop.

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is toepassing in de teelt van snijmaïs uitsluitend toegestaan wanneer er gebruikt wordt gemaakt van 90% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop en luchtondersteuning.

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is toepassing in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, tritcale en voedergrasland uitsluitend toegestaan wanneer er gebruikt wordt gemaakt van een van de volgende maatregelen:

- lage spuitboomhoogte (30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met een driftarme Venturidop en een kantdop;*
- conventionele spuit met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop en Hardi TwinForce luchtondersteuning.*