

2 juli 2021

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

**Toepassingsvoorwaarden:**

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Klein fruit (bedekte teelt)	Spintmijt <sup>1</sup>	0,75-1 L/ha	1 L/ha	15 per 12 maanden	15 L/ha per 12 maanden	5
Groenteteelt m.u.v. vruchtgroenten (bedekte teelt)	Wittevlieg <sup>3</sup>	0,3% (300 ml middel in 100 liter water)	3 L/ha	5 per teeltcyclus	15 L/ha per 12 maanden	5
Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> (bedekte teelt)	Spintmijt <sup>1</sup> , Tomatengalmijt <sup>2</sup>	0,15% (150 ml middel in 100 L water)	1,5 L/ha	15 per 12 maanden	22,5 L/ha per 12 maanden	5
	Wittevlieg <sup>3</sup>	0,3% (300 ml middel in 100 liter water)	3 L/ha	3 per teeltcyclus		
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil	Spintmijt <sup>1</sup>	0,15% (150 ml middel in 100 L water)	1,5 L/ha	15 per 12 maanden	22,5 L/ha per 12 maanden	5

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
(bedekte teelt)	Wittevlieg <sup>3</sup>	0,3% (300 ml middel in 100 liter water) <sup>3</sup>	3 L/ha	3 per teeltcyclus		
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met niet-eetbare schil (bedekte teelt)	Spintmijt <sup>1</sup>	0,15% (150 ml middel in 100 L water)	1,5 L/ha	15 per 12 maanden	22,5 L/ha per 12 maanden	5
	Wittevlieg <sup>3</sup>	0,3% (300 ml middel in 100 liter water)	3 L/ha	3 per teeltcyclus		
Sierteeltgewassen (bedekte teelt)	Wittevlieg <sup>3</sup>	0,3% (300 ml middel in 100 liter water)	3 L/ha	5 per teeltcyclus	15 L/ha per 12 maanden	5

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

<sup>1</sup> Spintmijt (*Tetranychus urticae*)

<sup>2</sup> Tomatengalmijt (*Aculops lycopersici*)

<sup>3</sup> Wittevlieg: Kaswittevlieg (*Trialeurodes vaporariorum*) en tabakswittevlieg (*Bemisia tabaci*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter/kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbei (onbedekte teelt)	Spintmijt <sup>1</sup> Wittevlieg <sup>3</sup>	0,75-1 L/ha	1 L/ha	15 per 12 maanden	15 L/ha per 12 maanden	5
	Californische trips <sup>2</sup>	1-1,5 L/ha	1,5 L/ha		22,5 L/ha per 12 maanden	
Bessen (onbedekte teelt)	Spintmijt <sup>1</sup> Wittevlieg <sup>3</sup>	0,75-1 L/ha	1 L/ha	15 per 12 maanden	15 L/ha per 12 maanden	5
	Californische trips <sup>4</sup>	1-1,5 L/ha	1,5 L/ha		22,5 L/ha per 12 maanden	
Bessen (bedekte teelt)	Wittevlieg <sup>3</sup>	0,75-1 L/ha	1 L/ha	15 per 12 maanden	15 L/ha per 12 maanden	5
	Californische trips <sup>4</sup>	1-1,5 L/ha	1,5 L/ha		22,5 L/ha per 12 maanden	
Druif (onbedekte teelt)	Witte vlieg <sup>3</sup>	0,75-1 L/ha	1 L/ha	15 per 12 maanden	15 L/ha per 12 maanden	5
	Spintmijt <sup>1</sup> Californische trips <sup>4</sup>	1-1,5 L/ha	1,5 L/ha		22,5 L/ha per 12 maanden	
Druif (bedekte teelt)	Witte vlieg <sup>3</sup>	0,75-1 L/ha	1 L/ha	15 per 12 maanden	15 L/ha per 12 maanden	5
	Californische trips <sup>4</sup>	1-1,5 L/ha	1,5 L/ha		22,5 L/ha per 12 maanden	
Braam- en framboos-achtigen ( <i>Rubus</i> spp) (onbedekte teelt)	Spintmijt <sup>1</sup> Bramengalmijt <sup>5</sup> Wittevlieg <sup>3</sup>	0,75-1 L/ha	1 L/ha	15 per 12 maanden	15 L/ha per 12 maanden	5
	Californische trips <sup>4</sup>	1-1,5 L/ha	1,5 L/ha		22,5 L/ha per 12 maanden	
	Bramengalmijt <sup>5</sup> Wittevlieg <sup>3</sup>	0,75-1 L/ha	1 L/ha	15 per 12 maanden	15 L/ha per 12 maanden	5

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter/kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Braam- en framboos-achtigen ( <i>Rubus</i> spp.) (bedekte teelt)	Californische trips <sup>4</sup>	1-1,5 L/ha	1,5 L/ha		22,5 L/ha per 12 maanden	

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

<sup>1</sup> Spintmijt (*Tetranychus urticae*)

<sup>2</sup> Tomatengalmijt (*Aculops lycopersici*)

<sup>3</sup> Wittevlug: Kaswittevlug (*Trialeurodes vaporariorum*) en tabakswittevlug (*Bemisia tabaci*)

<sup>4</sup> Californische trips (*Frankliniella occidentalis*)

<sup>5</sup> Bramengalmijt (*Acalitus essig*)

### Overige toepassingsvoorwaarden

Let op: de verpakking naspoelen bij het vullen van de tank wegens beperkte uitschenkbaarheid van het middel.

In de teelt van kleinfruit en de bedekte teelt van vruchtgroenten het middel toepassen in 600-1000L water/ha.

In de bedekte groenteteelt m.u.v. vruchtgroenten het middel toepassen in 200-1000 L water/ha.

In de bedekte sierteelt het middel toepassen in 500 tot 1000L water/ha.

Bevat *Beauveria bassiana* strain ATCC 74040. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Het is niet uitgesloten dat er na toepassing van het middel bij hoge luchtvochtigheid nuttige insecten geïnfecteerd worden met *Beauveria bassiana*. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van bestuivers over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Let op: De gewasveiligheid van Naturalis is voor de bedekte teelt van sla (*Lactuca* spp) en andijvie niet onderbouwd. Voer een proefbespuiting uit voordat Naturalis in de bedekte teelt van sla (*Lactuca* spp) en andijvie op grote schaal toegepast w