

30 december 2022

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

**Toepassingsvoorwaarden:**

Toepassingsgebied	Werkzaamheid id getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Courgette (onbedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>1</sup>	0,15 L/ha	2	7	1
Komkommer (bedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>1</sup>	0,15 L/ha	2	7	1
Meloen (bedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>1</sup>	0,15 L/ha	2	7	1
Aubergine (bedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>2</sup>	0,15 L/ha	2	7	3
Tomaat (bedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>2</sup>	0,15 L/ha	2	7	3
Paprika (bedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>2</sup>	0,15 L/ha	2	7	1

\*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

<sup>1</sup> Echte meeldauw (*Podosphaera xanthii*)

<sup>2</sup> Echte meeldauw (*Leveillula taurica*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardbei	Echte meeldauw <sup>3</sup>	0,15 L/ha	2 per teeltcyclus	7	3
Courgette (bedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>1</sup>	0,15 L/ha	2 per teeltcyclus	7	1
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>4</sup>	0,15 L/ha	2 per 12 maanden	7	-
Potplanten (bedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>4</sup>	0,15 L/ha	2 per 12 maanden	7	-
Snijbloemen (bedekte, grondgebonden teelt)	Echte meeldauw <sup>4</sup>	0,15 L/ha	2 per 12 maanden	7	-
Snijbloemen (bedekte, niet-grondgebonden teelt)	Echte meeldauw <sup>4</sup>	0,15 L/ha	2 per 12 maanden	7	-
Laanbomen (onbedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>4</sup>	0,15 L/ha	2 per 12 maanden	7	-
Klimplanten (onbedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>4</sup>	0,15 L/ha	2 per 12 maanden	7	-
Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>4</sup>	0,15 L/ha	2 per 12 maanden	7	-
Coniferen incl. kerstbomen (onbedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>4</sup>	0,15 L/ha	2 per 12 maanden	7	-

Heide soorten (onbedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>4</sup>	0,15 L/ha	2 per 12 maanden	7	-
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>4</sup>	0,15 L/ha	2 per 12 maanden	7	-
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>4</sup>	0,15 L/ha	2 per 12 maanden	7	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>5,6</sup>	0,15 L/ha	2 per 12 maanden	7	-
Vaste plantenteelt	Echte meeldauw <sup>4</sup>	0,15 L/ha	2 per 12 maanden	7	-
Bloemenzaadteelt	Echte meeldauw <sup>4</sup>	0,15 L/ha	2 per 12 maanden	7	-
Veredeling- en zaadteelt (bedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>4</sup>	0,15 L/ha	2 per 12 maanden	7	-
Veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, maïs, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>4</sup>	0,15 L/ha	2 per 12 maanden	7	-

\*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken

<sup>1</sup> Echte meeldauw (*Podospaera xanthii*)

<sup>3</sup> Echte meeldauw (*Podospaera aphanis*/*Sphaerotheca macularis*)

<sup>4</sup> Echte meeldauw (*Erysiphe cichoracearum*)

<sup>5</sup> Echte meeldauw (*Microsphaera alni*)

<sup>6</sup> Echte meeldauw (*Phyllactinia* spp.)

#### Overige toepassingsvoorwaarden

In de onbedekte teelt van courgette, de teelt van komkommer en meloen het middel toepassen in 500–1500 liter water per ha.

In de teelt van aubergine en tomaat het middel toepassen in 800–1000 liter water per ha.

In de teelt van paprika het middel toepassen in 300–1000 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van courgette uitsluitend opwaarts/neerwaarts/zijwaarts toepassen met een machinaal voortgetrokken veldspuit.

Voor een goede bestrijding van echte meeldauw het middel preventief toepassen.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

### **Resistentiemanagement**

Dit middel bevat de werkzame stof cyflufenamid. Cyflufenamid behoort tot de phenyl-acetamiden. De Frac code is U 06. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.