

## Rizolex vloeibaar, 11098 N

20 augustus 2020

### Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

### Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Veiligheidstermijn in dagen
Bloembol-en bloemknolgewassen (bedekte teelt)	Potgrondbehandeling	Bodemschimmels <sup>1</sup> Kwade grond <sup>2</sup>	100 ml middel per m <sup>3</sup> potgrond	1	50 L/ha	-
Bloembol-en bloemknolgewassen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Bodemschimmels <sup>1</sup>	2 ml per m <sup>2</sup>	1	20 L/ha	-
Snijbloemen (bedekte teelt)	Grondbehandeling voor planten	Bodemschimmels <sup>1</sup>	3,2 ml middel per m <sup>2</sup>	1	32 L/ha	
	Aangietbehandeling voor planten					
Potplanten (bedekte teelt)	Potgrondbehandeling	Bodemschimmels <sup>1</sup>	250 ml middel per 10l water per m <sup>3</sup> potgrond	1	-	-
	Aangietbehandeling		0,1% (100 ml middel per 100 L water)	1	-	-

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

<sup>1</sup> Zwartrot, zwartpoten, bodemschimmels (*Rhizoctonia solani*/*Thanatephorus cucumeris*)

<sup>2</sup> Kwade grond (*Rhizoctonia tuliparum*).

Het gebruik in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, vaste planten en bloemenzaadteelt is op basis van een “derdenuitbreiding” en beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassings gebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Veiligheidstermijn in dagen
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Bodemschimmels <sup>1</sup>	2 ml per m <sup>2</sup>	1	20 L/ha	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Bodemschimmels <sup>1</sup>	2 ml per m <sup>2</sup>	1	20 L/ha	-
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Bodemschimmels <sup>1</sup>	2 ml per m <sup>2</sup>	1	20 L/ha	-

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

<sup>1</sup>Zwartrot, bodemschimmels (*Rhizoctonia solani*/ *Thanatephorus cucumeris*)

### Overige toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is - in de onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, vaste planten en bloemenzaadteelt - bespuiting op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van een beddenfrees in combinatie met minimaal 90% drift reducerende spuitdoppen.

Bij de grondbehandeling in de onbedekte teelten het middel volvelds spuiten en tenminste 10 cm diep inwerken met behulp van een frees.

### Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding

Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd (en de kas gedurende 2 uur geventileerd is).

Wanneer Rizolex vloeibaar wordt gebruikt in de voor bloemisterijgewassen benodigde dosering (3,2 ml middel per m<sup>2</sup>) dan kunnen, in verband met de kans op smaakafwijkingen, geen groentegewassen als tussen- of vervanggewas worden verbouwd.

### Gevoeligheid gewassen

Gezien het grote aantal variëteiten en verschillende teeltomstandigheden van in het wettelijk gebruiksvorschrift genoemde gewassen is het onmogelijk de gewasveiligheid voor alle gewassen onder alle omstandigheden te onderzoeken. De toepasser van dit product zal, indien met een cultivar/variëteit in een groeistadium of onder bepaalde teeltomstandigheden of teeltwijze nog geen eigen ervaring is opgedaan, zelf een proefbespuiting/toepassing op kleine schaal dienen uit te voeren onder de eigen teeltomstandigheden om verantwoordelijkheid voor de gewasveiligheid te kunnen nemen.

Niet toepassen bij Anthurium en Poinsettia.

Bij Begonia, Cyclamen en Fuchsia is kans op enige schade niet uitgesloten.