

3 juni 2022

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Groententeelt (bedekte teelt)	mengen door substraat	wortelziekten ¹	0,5% (500 g middel per 100 L water)	500 g/1000 L substraat	2	28
	gieten, druppelen of spuiten na opkomst		0,5% (500 g middel per 100 L water)	10 g/m ²	6	28
	gieten of druppelen na verplanten		200-250 g/1000 planten	250 g/1000 planten	6	28
	gewasbehandeling na opkomst	Botrytis ²	0,5% (500 g middel per 100 L water)	7,5 kg/ha	6	21
Komkommer (bedekte teelt)	gewasbehandeling na verplanten	Botrytis ² , bladvlekkenziekte ³	0,5% (500 g middel per 100 L water)	10 L spuitoplossing per 500 planten	6	21
Tomaat (bedekte teelt)	gewasbehandeling na verplanten	grauwe schimmel ⁴	0,5% (500 g middel per 100 L water)	10 L spuitoplossing per 500 planten	6	21

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Paprika (bedekte teelt)	gewasbehandeling na verplanten	grauwe schimmel ⁴	0,5% (500 g middel per 100 L water)	10 L spuitoplossing per 500 planten	6	21
Kruidenteelt (bedekte teelt)	mengen door substraat	wortelziekten ¹	0,5% (500 g middel per 100 L water)	500 g/1000 L substraat	2	28
	gieten of spuiten na opkomst		0,5% (500 g middel per 100 L water)	10 g/m ²	6	28
	druppelen na verplanten		200-250 g/1000 planten	250 g/1000 planten	6	28
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	mengen door substraat	wortelziekten ¹	0,5% (500 g middel per 100 L water)	500 g/1000 L substraat	2	28
	gieten of spuiten na opkomst		0,5% (500 g middel per 100 L water)	10 g/m ²	6	28
	druppelen na verplanten		200-250 g/1000 planten	250 g/1000 planten	6	28
	gewasbehandeling na opkomst	grauwe schimmel ⁴	0,5% (500 g middel per 100 L water)	5 kg/ha	6	21

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ wortelziekten (*Pythium* spp, *Phytophthora* spp, *Rhizoconia* spp, *Fusarium* spp)

² Botrytis (*Botrytis* spp)

³ bladvlekkenziekte (*Stagonosporopsis cucurbitacearum* / *Didymella bryoniae*)

⁴ Grauwe schimmel (*Botryotinia fuckeliana* / *Botrytis cinerea*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Bevat micro-organisme *Clonostachys rosea* J1446. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

Het middel wordt gebruikt na menging met water. Eerst het poeder met een weinig water oplossen. Goed schudden tot er een homogene spuitoplossing gevormd is. Daarna water bijvoegen tot de gewenste eindconcentratie. De hoeveelheid water aanpassen aan de vochtigheid van het teeltsubstraat.

Het middel niet mengen met andere middelen of met meststoffen.

Het middel mag niet gebruikt worden op houtachtige stekken zonder beworteling.