

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Actueel WG van het middel FLUROSTAR 200, 13370 N

W.2

3 juni 2016

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Wintertarwe	Na opkomst	Kleefkruid ¹ , muur ²	1 L/ha	1 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Wintergerst	Na opkomst	Kleefkruid ¹ , muur ²	1 L/ha	1 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Winterrogge	Na opkomst	Kleefkruid ¹ , muur ²	1 L/ha	1 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Zomerrogge	Na opkomst	Kleefkruid ¹ , muur ²	1 L/ha	1 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Triticale	Na opkomst	Kleefkruid ¹ , muur ²	1 L/ha	1 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Zomertarwe	Na opkomst	Kleefkruid ¹ , muur ²	0,75 L/ha	0,75 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Zomergerst	Na opkomst	Kleefkruid ¹ , muur ²	0,75 L/ha	0,75 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Haver	Na opkomst	Kleefkruid ¹ , muur ²	0,75 L/ha	0,75 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Mais	Na opkomst	Zwarte nachtschade ³	1 L/ha	1 L/ha	1 per teeltcyclus	-

Toepassings-gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Cultuurgrasland	Na opkomst	Muur ²	0,75 L/ha	0,75 L/ha	1 per 12 maanden	7 dagen tussen toepassing en beweiden en/of maaien
	Over het gewas	Ridderzuring ⁴ , grote brandnetel ⁵ , paardebloem ⁶	2 L/ha of	2 L/ha		
	Pleksgewijs	Ridderzuring ⁴ , grote brandnetel ⁵	0,3% (30 ml per 10L water)	0,12 l/ha ⁷		

¹ kleefkruid (*Galium aparine*)

² muur (*Stellaria media*)

³ zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*)

⁴ ridderzuring (*Rumex obtusifolius*)

⁵ grote brandnetel (*Urtica dioica*)

⁶ paardebloem (*Taraxacum officinale*)

⁷ Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden.

Toepassingsvoorwaarden

In granen het middel toepassen in 150-400 liter water per ha. In maïs 200-300 liter water per ha toepassen. In pas ingezaaid voedergrasland 200-400 liter water per ha gebruiken en in oud voedergrasland 300-400 liter water per ha.

In granen het middel toepassen in de periode van maart tot en met mei.

In granen het middel toepassen vanaf het tweede bladstadium en in maïs vanaf het derde bladstadium.

In cultuurgrasland het middel toepassen in de periode maart tot en met augustus.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing in zomer- en wintergranen, maïs en cultuurgrasland uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% drift reducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop.

Gewasschade bij volveldstoepassing in maïs is niet uitgesloten.

