

28 februari 2020

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardbei (bedekte teelt)	Botrytis ¹	1,2 kg/ha	-	3	7	1
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt)	Botrytis ¹	0,08 - 0,12% (80 - 120 g middel per 100 liter water)	1,2 kg/ha	3	10	1
Vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte teelt)	Botrytis ¹	0,08 - 0,12% (80 - 120 g middel per 100 liter water)	1,2 kg/ha	3	10	1
Tulp (onbedekte teelt)	Botrytis ²	0,8 kg/ha	-	3	7	-

¹ Botrytis (*Botrytis cinerea*)

² Botrytis (*Botrytis tulipae*)

Het gebruik in de onbedekte teelt van aardbei, bloemisterijgewassen, de bedekte teelt van potplanten en snijbloemen, de onbedekte teelt van bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardbei (onbedekte teelt)	Botrytis ¹	1,2 kg/ha	3	7	1
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Botrytis ¹	0,8 kg/ha	3	7	-
Potplanten (bedekte teelt)	Botrytis ¹	1,2 kg/ha	3	7	-
Snijbloemen (grondgebonden bedekte teelt)	Botrytis ¹	1,2 kg/ha	3	7	-
Snijbloemen (niet grondgebonden bedekte teelt)	Botrytis ¹	1,2 kg/ha	3	7	-
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie (onbedekte teelt)	Botrytis ³	0,8 kg/ha	3	7	-

¹ Botrytis (*Botrytis cinerea*)

³ Botrytis (*Botrytis* spp.)

Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van aardbei het middel toepassen in 500-1500 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen mag het middel alleen toegepast worden tot 9 of meer gestrekte internodiën (BBCH39).

Resistentie management

Dit middel bevat de werkzame stof fenpyrazamine. Fenpyrazamine behoort tot de amino-pyrazolinonen. De Frac code is 17. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.