

7 december 2018

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

**Toepassingsvoorwaarden:**

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Wintergraan m.u.v. kanariezaad	Echte meeldauw <sup>1</sup>	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2 per teeltcyclus	28	49
Zomertarwe	Echte meeldauw <sup>1</sup>	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2 per teeltcyclus	28	49
Zomergerst	Echte meeldauw <sup>1</sup>	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2 per teeltcyclus	28	49
Appel	Echte meeldauw <sup>2</sup>	0,05% (50 mL middel per 100 L water)	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	7	14
Peer	Echte meeldauw <sup>2</sup>	0,05% (50 mL middel per 100 L water)	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	7	14

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

<sup>1</sup> Echte meeldauw (*Blumeria graminis*/*Erysiphe graminis*)

<sup>2</sup> Echte meeldauw (*Podosphaera leucotricha*)

Het gebruik in de onbedekte teelt van druiven en vruchtbomen van appel en peer is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te

voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Vruchtbomen en -struiken van appel en peer (onbedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>2</sup>	0,5 L/ha	2	7	-
Druif (onbedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>3</sup>	0,5 L/ha	2	14	21

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

<sup>2</sup> Echte meeldauw (*Podosphaera leucotricha*)

<sup>3</sup> Echte meeldauw (*Uncinula necator/Erysiphe necator*)

### Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van granen, wanneer bij het einde van de uitstoeling (BBCH 29) symptomen worden waargenomen, een behandeling uitvoeren. Indien nodig de toepassing maximaal eenmaal herhalen bij het in de aar komen van het gewas tot uiterlijk gewasstadium BBCH 59.

In de teelt van appel en peer, het middel toepassen in de periode vanaf het groene knopstadium (BBCH 30) tot het moment dat de vruchten 70% van het uiteindelijke formaat (BBCH 77) hebben.

### Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof cyflufenamid. Cyflufenamid behoort tot de phenyl-acetamiden. De Frac code is U06. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.