

1 april 2022

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Het middel is uitsluitend toegelaten als insecten en mijtenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

**Toepassingsvoorwaarden:**

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Klein fruit (bedekte teelt)	Wittevlieg <sup>1</sup> , Spint <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	24 L/ha	20 per teeltcyclus/ 40 per 12 maanden	3
Bladgroenten (bedekte teelt)	Wittevlieg <sup>1</sup> , Spint <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	20 per 12 maanden	3
Peulgroenten (bedekte teelt)	Wittevlieg <sup>1</sup> , Spint <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	20 per teeltcyclus/ 60 per 12 maanden	3
Vruchtgroenten (bedekte teelt)	Wittevlieg <sup>1</sup> , Spint <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	60 L/ha	20 per teeltcyclus/ 60 per 12 maanden	3
Kruidenteelt (vers of gedroogd) (bedekte teelt)	Wittevlieg <sup>1</sup> , Spint <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	20 per teeltcyclus/ 40 per 12 maanden	3
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	Wittevlieg <sup>1</sup> , Spint <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	60 L/ha	20 per 12 maanden	3

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Wittevlieg <sup>1</sup> , Spint <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	24 L/ha	20 per 12 maanden	3
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	Wittevlieg <sup>1</sup> , Spint <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	20 per 12 maanden	3
Veredeling- en zaadteelt van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt)	Wittevlieg <sup>1</sup> , Spint <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	24 L/ha	20 per 12 maanden	3

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

<sup>1</sup> Wittevlieg (*Trialeurodes vaporariorum* en *Bemisia tabaci*)

<sup>2</sup> Spint (*Tetranychus urticae*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardappel (onbedekte teelt)	Spint <sup>1</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per 12 maanden	3

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Consumptieaardappel (bedekte teelt)	Spint <sup>1</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per 12 maanden	3
Peulvruchten	Spint <sup>1</sup> Wittevlieg <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per 12 maanden	3
Oliehoudende zaden	Spint <sup>1</sup> Wittevlieg <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per 12 maanden	3
Vezelgewassen	Spint <sup>1</sup> Wittevlieg <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per 12 maanden	3
Witlof (pennenteelt) (onbedekte teelt)	Spint <sup>1</sup> Wittevlieg <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per 12 maanden	3
Hop	Spint <sup>1</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per 12 maanden	3
Kweeper (onbedekte teelt)	Spint <sup>1,3</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	30 L/ha	5 per 12 maanden	3
Mispel (onbedekte teelt)	Spint <sup>1,3</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	30 L/ha	5 per 12 maanden	3
Steenvruchten	Spint <sup>1</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	30 L/ha	5 per 12 maanden	3
Aardbei (onbedekte teelt)	Spint <sup>1</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	24 L/ha	5 per 12 maanden	3
Bessen (onbedekte teelt)	Spint <sup>1</sup> Dopluis <sup>4</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	24 L/ha	5 per 12 maanden	3
Druif (onbedekte teelt)	Spint <sup>1</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	24 L/ha	5 per 12 maanden	3
Braam- en framboos-achtigen ( <i>Rubus</i> spp.) (onbedekte teelt)	Spint <sup>1</sup> Wittevlieg <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	24 L/ha	5 per 12 maanden	3

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Vijg (bedekte teelt)	Spint <sup>1</sup> Wittevlieg <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	30 L/ha	5 per 12 maanden	3
Kiwi (onbedekte teelt)	Spint <sup>1</sup> Wittevlieg <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	30 L/ha	5 per 12 maanden	3
Sla (onbedekte teelt)	Spint <sup>1</sup> Wittevlieg <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per teeltcyclus, 15 per 12 maanden	3
Andijvie (onbedekte teelt)	Spint <sup>1</sup> Wittevlieg <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per teeltcyclus, 15 per 12 maanden	3
Spinazie-achtigen (onbedekte teelt)	Spint <sup>1</sup> Wittevlieg <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per teeltcyclus, 10 per 12 maanden	3
Witlof (trekteelt) (bedekte teelt)	Spint <sup>1</sup> Wittevlieg <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per teeltcyclus, 15 per 12 maanden	3
Veldsla (onbedekte teelt)	Spint <sup>1</sup> Wittevlieg <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per teeltcyclus, 15 per 12 maanden	3
Rucola (onbedekte teelt)	Spint <sup>1</sup> Wittevlieg <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per teeltcyclus, 15 per 12 maanden	3
Lamsoor (onbedekte teelt)	Spint <sup>1</sup> Wittevlieg <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per 12 maanden	3
Boon met peul (onbedekte teelt)	Spint <sup>1</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per teeltcyclus, 10 per 12 maanden	3
Boon met peul (bedekte teelt)	Spint <sup>1</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	40 L/ha	5 per teeltcyclus, 15 per 12 maanden	3
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> eetbare schil (onbedekte teelt)	Spint <sup>1</sup> Wittevlieg <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per teeltcyclus, 10 per 12 maanden	3

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> niet-eetbare schil (onbedekte teelt)	Spint <sup>1</sup> Wittevlieg <sup>2</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per 12 maanden	3
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)	Wittevlieg <sup>5</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per 12 maanden	3
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	Wittevlieg <sup>5</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per 12 maanden	3
Bloemkoolachtigen (bedekte teelt)	Wittevlieg <sup>5</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per teeltcyclus, 10 per 12 maanden	3
Bladkoolachtigen (onbedekte teelt)	Wittevlieg <sup>5</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per 12 maanden	3
Bladkoolachtigen (bedekte teelt)	Wittevlieg <sup>5</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per teeltcyclus, 25 per 12 maanden	3
Stengelkool (onbedekte teelt)	Wittevlieg <sup>5</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per teeltcyclus, 15 per 12 maanden	3
Kruidenteelt vers of gedroogd (onbedekte teelt)	Spint <sup>1</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per 12 maanden	3
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Spint <sup>1</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	24 L/ha	5 per 12 maanden	3
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	Spint <sup>1</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	24 L/ha	5 per 12 maanden	3
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Spint <sup>1</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	20 L/ha	5 per 12 maanden	3
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Spint <sup>1</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	24 L/ha	5 per 12 maanden	3

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Veredeling en zaadteelt m.u.v. aardappel, mais, granen en graszaadteelt (onbedekte teelt)	Spint <sup>1</sup>	2% (2 L middel per 100 liter water)	24 L/ha	5 per 12 maanden	3

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

<sup>1</sup> Spint (*Tetranychus urticae*)

<sup>2</sup> Wittevlies (*Trialeurodes vaporariorum* en *Bemisia tabaci*).

<sup>3</sup> Spint (*Panonychus ulmi*)

<sup>4</sup> Dopluis (*Parthenolecanium corni*)

<sup>5</sup> Koolwittevlies (*Aleyrodes proletella*)

### Overige toepassingsvoorwaarden

Bereid de spuitoplossing door de formulering voorzichtig in het water te mengen om overmatig schuimen te voorkomen.

Voor zilte teelten (lamsoor, zeekraal) is toepassing alleen toegestaan mits de teelt plaatsvindt in bassins.

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van bestuivers over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Let op: het verdient aanbeveling vast te stellen middels een proefbespuiting of het betreffende gewas de behandeling verdraagt.

Let op: veelvuldig gebruik op dezelfde planten kan kleverigheid op bladeren en vruchten veroorzaken.