

Manfil 80 WP, 13907 N

23 juni 2017

Ingangsdatum 1 januari 2019

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassings-Gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Aardappelen (onbedekte teelt)	Aardappelziekte ¹	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha	8 per teeltcyclus	8	7
Appel (onbedekte teelt)	Schurft ²	0,2 % (200 gr in 100 liter water)	3,0 kg/ha	1 per 12 maanden	-	35
Peer (onbedekte teelt)	Schurft ³	0,2 % (200 gr in 10 liter water)	2,4 kg/ha	1 per 12 maanden	-	35
Druif (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ⁴	0,2 % (200 gr in 100 liter water)	2,4 kg/ha	2 per 12 maanden	21	63

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Aardappelziekte (*Phytophthora infestans*)

² Schurft (*Venturia inaequalis*)

³ Schurft (*Venturia pirina*)

⁴ Valse meeldauw (*Plasmopara viticola*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van aardappelen het middel toepassen met een volume van 200-400 L water/ha.

Bij voor *Phytophthora* gunstige omstandigheden overgaan op andere voor de *Phytophthora*-bestrijding in aardappelen toegelaten middelen, teneinde een goede bescherming van de knol te verkrijgen. Dit geldt met name voor in het loof en knol vatbare rassen.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in appels, peren en druiven op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan na 1 mei en indien gebruik wordt gemaakt van de volgende driftreducerende spuittechnieken:

- het middel verspoten wordt met een tunnelspuit (met uitzondering van de toepassing in appelbomen ouder dan drie jaar);
- het middel in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater verspoten wordt met een Venturidop, waarbij de laatste bomenrij éénzijdig in de richting van het perceel bespoten dient te worden;
- de laatste bomenrij éénzijdig wordt bespoten in de richting van het perceel in combinatie met een windhaag op de rand van het rijpad.
- het middel wordt verspoten met een Wannerspuit met reflectiescherm en venturidoppen (Lechler ID 90-015C).

Om de vogels te beschermen is toepassing in de teelt van aardappels uitsluitend toegestaan vanaf BBCH 40, wanneer knol- of bolvorming begint, en met een interval van minimaal 8 dagen.

In verband met mogelijke gewasschade wordt een toepassing op het perenras Conference afgeraden.