

1 januari 2019

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassings gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Wintertarwe	Oogvlekkenziekte ¹ Bladvlekkenziekte ² Gele bladvlekkenziekte (DTR) ³ Bruine roest ⁴	1,5 L/ha	2	14	35
Wintergerst	Oogvlekkenziekte ¹ Netvlekkenziekte ⁵ Bladvlekkenziekte ⁶ Dwergroest ⁷	1,5 L/ha	2	14	35
Winterrogge	Oogvlekkenziekte ¹ Bruine roest ⁴ Bladvlekkenziekte ⁶	1,5 L/ha	2	14	35
Triticale	Oogvlekkenziekte ¹ Bladvlekkenziekte ² Gele bladvlekkenziekte (DTR) ³ Bruine roest ⁴	1,5 L/ha	2	14	35
Spelt	Oogvlekkenziekte ¹	1,5 L/ha	2	14	35

Toepassings gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
	Bladvlekkenziekte ² Gele bladvlekkenziekte (DTR) ³ Bruine roest ⁴				
Zomertarwe	Oogvlekkenziekte ¹ Bladvlekkenziekte ² Gele bladvlekkenziekte (DTR) ³ Bruine roest ⁴	1,5 L/ha	2	14	35
Zomergerst	Oogvlekkenziekte ¹ Netvlekkenziekte ⁵ Bladvlekkenziekte ⁶ Dwergroest ⁷	1,5 L/ha	2	14	35
Zomerrogge	Oogvlekkenziekte ¹ Bruine roest ⁴ Bladvlekkenziekte ⁶	1,5 L/ha	2	14	35
Haver	Kroonroest ⁸	1,5 L/ha	2	14	35

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Oogvlekkenziekte (*Pseudocercospora herpotrichoides*)

² Bladvlekkenziekte (*Mycosphaerella graminicola/ Septoria tritici*)

³ Gele bladvlekkenziekte (*Pyrenophora tritici-repentis*)

⁴ Bruine roest (*Puccinia recondita*)

⁵ Netvlekkenziekte (*Pyrenophora teres*)

⁶ Bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

⁷ Dwergroest (*Puccinia hordei*)

⁸ Kroonroest (*Puccinia coronata*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 200-400 L water/hectare.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen epoxiconazool en boscalid. Epoxiconazool behoort tot de 'demethylation inhibitors' (DMI fungiciden), subgroep triazolen. De FRAC code is 3. Boscalid behoort tot de pyridine-carboxamides. De FRAC code is 7. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.