

3 december 2021

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Appel (onbedekte teelt)	Schurft ¹	1,7 L/ha	2	60	60
Peer (onbedekte teelt)	Schurft ²	1,7 L/ha	2	60	60
Kweeper (onbedekte teelt)	Schurft ^{1,2}	1,7 L/ha	1	-	60
Mispel (onbedekte teelt)	Schurft ^{1,2}	1,7 L/ha	1	-	60
Kers (onbedekte teelt)	Bladvlekkenziekte ³	1,7 L/ha	2	60	14
Vruchtbomen en struiken van pitvruchten incl. vruchtboomonderstammen (onbedekte teelt)	Schurft ^{1,2}	1,7 L/ha	1	-	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Schurft (*Venturia inaequalis*);

² Schurft (*Venturia pirina*);

³ Bladvlekkenziekte (*Blumeriella jaapii* / *Coccomyces hiemalis* / *Cylindrosporium padi*).

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van appel en peer het middel toepassen net voor de bloei (BBCH 54-59) of na de bloei tot aan de oogst (BBCH 71-79), rekening houdend met de veiligheidstermijn.

In de teelt van kweepeer, mispel en vruchtbomen en –struiken van pitvruchten het middel toepassen net voor de bloei (BBCH 53-59) of na de bloei tot aan de oogst (BBCH 71-79).

In de teelt van kers het middel toepassen na de bloei tot het fruit half volgroeid is (BBCH 71-75) en/of na de oogst tot dat het blad gevallen is (BBCH 90-97).

Let op: De behandeling geeft een risico op vruchtverruwing in appelbomen. Het middel daarom niet toepassen onder grillige weersomstandigheden in de periode vanaf het roze knop stadium tot 42 dagen na de bloei (BBCH 51 – 72).

Let op: Voor een goede schurft bestrijding het middel afwisselen met andere daartoe toegelaten middelen op basis van een andere werkzame stof.