

Actueel WG van het middel UPL Pirimicarb

W.5

9 mei 2018

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

| Toepassingsgebied  | Te bestrijden organisme | Dosering (middel) per toepassing | Maximale dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden |
|--|-------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|
| Poot aardappel   | bladluis (bladrolvirus) | 0,5 kg/ha                        | 0,5 kg/ha                                 | 2 per teeltcyclus  | 14  | 7   |
| Consumptie aardappel   | bladluis                | 0,5 kg/ha                        | 0,5 kg/ha                                 | 2 per teeltcyclus  | 10  | 7   |
| Zetmeel aardappel  | bladluis                | 0,5 kg/ha                        | 0,5 kg/ha                                 | 2 per teeltcyclus  | 10  | 7   |
| Bieten   | bladluis <sup>1</sup>   | 0,4 kg/ha                        | 0,4 kg/ha                                 | 2 per teeltcyclus  | 14  | 7   |
| Wintertarwe  | bladluis                | 0,25 kg/ha                       | 0,25 kg/ha                                | 2 per teeltcyclus  | 14  | BBCH 85 korrelinhoud deegachtig   |
| Wintergerst  | bladluis                | 0,25 kg/ha                       | 0,25 kg/ha                                | 2 per teeltcyclus  | 14  | BBCH 85 korrelinhoud deegachtig   |
| Zomertarwe   | bladluis                | 0,25 kg/ha                       | 0,25 kg/ha                                | 2 per teeltcyclus  | 14  | BBCH 85 korrelinhoud deegachtig   |
| Zomergerst   | bladluis                | 0,25 kg/ha                       | 0,25 kg/ha                                | 2 per teeltcyclus  | 14  | BBCH 85 korrelinhoud deegachtig   |
| Droog te oogsten erwten  | bladluis                | 0,5 kg/ha                        | 0,5 kg/ha                                 | 2 per teeltcyclus  | 10  | 14  |
| Droog te oogsten bonen (incl. soja indien niet bestemd voor oliewinning) | bladluis                | 0,5 kg/ha                        | 0,5 kg/ha                                 | 2 per teeltcyclus  | 10  | 14  |
| Graszaadteelt  | bladluis                | 0,5 kg/ha                        | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 7   | -   |
| Blauwmaanzaad  | bladluis                | 0,5 kg/ha                        | 0,5 kg/ha                                 | 2 per teeltcyclus  | 7   | 21  |
| Luzerne  | bladluis                | 0,5 kg/ha                        | 0,5 kg/ha                                 | 2 per teeltcyclus  | 10  | 7   |
| Veldboon (voor ensilage)   | bladluis                | 0,5 kg/ha                        | 0,5 kg/ha                                 | 2 per teeltcyclus  | 10  | 14  |

| Toepassingsgebied          | Te bestrijden organisme            | Dosering (middel) per toepassing    | Maximale dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|
| Appel                      | bladluis en bloedluis <sup>2</sup> | 0,05% (50 gram per 100 liter water) | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 7   | 14  |
| Peer                       | bladluis                           | 0,05% (50 gram per 100 liter water) | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 7   | 14  |
| Kers (onbedekte teelt)     | bladluis                           | 0,05% (50 gram per 100 liter water) | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 7   | 7   |
| Pruim (onbedekte teelt)    | bladluis                           | 0,05% (50 gram per 100 liter water) | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 7   | 14  |
| Perzik                     | bladluis                           | 0,05% (50 gram per 100 liter water) | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 7   | 7   |
| Aardbei (bedekte teelt)    | bladluis                           | 0,05% (50 gram per 100 liter water) | 0,6 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 7   | 3   |
| Aardbei (onbedekte teelt)  | bladluis                           | 0,05% (50 gram per 100 liter water) | 0,3 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 7   | 3   |
| Aalbes (onbedekte teelt)   | bladluis                           | 0,05% (50 gram per 100 liter water) | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 12  | 3   |
| Kruisbes (onbedekte teelt) | bladluis                           | 0,05% (50 gram per 100 liter water) | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 12  | 3   |
| Braam (onbedekte teelt)    | bladluis                           | 0,05% (50 gram per 100 liter water) | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 14  | 7   |

| Toepassingsgebied  | Te bestrijden organisme | Dosering (middel) per toepassing    | Maximale dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|
| Framboos (onbedekte teelt)   | bladluis                | 0,05% (50 gram per 100 liter water) | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 14  | 7   |
| Sla ( <i>Lactuca</i> spp.) (bedekte teelt)                                     | bladluis                | 0,5 kg/ha                           | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 10  | 14  |
| Sla ( <i>Lactuca</i> spp.) (onbedekte teelt)                                   | bladluis                | 0,5 kg/ha                           | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 7   | 10  |
| Andijvie (bedekte teelt)   | bladluis                | 0,5 kg/ha                           | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 10  | 21  |
| Andijvie (onbedekte teelt)   | bladluis                | 0,5 kg/ha                           | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 7   | 21  |
| Spinazie (onbedekte teelt)   | bladluis                | 0,3 kg/ha                           | 0,3 kg/ha                                 | 3 per 12 maanden   | 10  | 7   |
| Postelein  | bladluis                | 0,5 kg/ha                           | 0,5 kg/ha                                 | 3 per 12 maanden   | 10  | 7   |
| Veldsla  | bladluis                | 0,5 kg/ha                           | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 10  | 10  |
| Boon met peul (onbedekte teelt)  | bladluis                | 0,5 kg/ha                           | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 7   | 3   |
| Boon zonder peul (onbedekte teelt)   | bladluis                | 0,5 kg/ha                           | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 7   | 7   |
| Erwt zonder peul (onbedekte teelt)   | bladluis                | 0,5 kg/ha                           | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 10  | 7   |
| Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil (bedekte teelt)      | bladluis                | 0,05% (50 gram per 100 liter water) | 0,75 kg/ha                                | 2 per 12 maanden   | 10  | 1   |
| Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met niet-eetbare schil (bedekte teelt) | bladluis                | 0,05% (50 gram per 100 liter water) | 0,75 kg/ha                                | 2 per 12 maanden   | 7   | 3   |
| Tomaat   | bladluis                | 0,05% (50 gram per 100 liter water) | 0,75 kg/ha                                | 2 per 12 maanden   | 10  | 1   |
| Aubergine  | bladluis                | 0,05% (50 gram per 100 liter        | 0,75 kg/ha                                | 2 per 12 maanden   | 10  | 1   |

| Toepassingsgebied                   | Te bestrijden organisme | Dosering (middel) per toepassing    | Maximale dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|
|                                     |                         | water)                              |   |  |   |   |
| Paprika                             | bladluis                | 0,05% (50 gram per 100 liter water) | 0,75 kg/ha                                | 2 per 12 maanden   | 7   | 1   |
| Sluitkool                           | bladluis                | 0,5 kg/ha                           | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 7   | 3   |
| Spruitkool                          | bladluis                | 0,5 kg/ha                           | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 10  | 3   |
| Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt) | bladluis                | 0,5 kg/ha                           | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 7   | 7   |
| Chinees kool (onbedekte teelt)      | bladluis                | 0,42 kg/ha                          | 0,42 kg/ha                                | 2 per 12 maanden   | 14  | 3   |
| koolrabi (onbedekte teelt)          | bladluis                | 0,25 kg/ha                          | 0,25 kg/ha                                | 3 per 12 maanden   | 7   | 7   |
| Wortelen (onbedekte teelt)          | bladluis                | 0,5 kg/ha                           | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 10  | 7   |
| Koolraap                            | bladluis                | 0,5 kg/ha                           | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 14  | 7   |
| Rode biet                           | bladluis                | 0,5 kg/ha                           | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 14  | 7   |
| Kruidenteelt vers of gedroogd       | bladluis                | 0,5 kg/ha                           | 0,5 kg/ha                                 | 2 per 12 maanden   | 10  | 10  |

<sup>1</sup> groene perzikluis (*Myzus persicae*), zwarte boneluis (*Aphis fabae*)

<sup>2</sup> bloedluis (*Eriosoma lanigerum*)

### Toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is de zij- of opwaartse toepassing in de onbedekte teelt van aalbes, kruisbes, braam, framboos uitsluitend toegestaan op percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing (neerwaarts spuiten) in de onbedekte teelten van bieten, droog te oogsten erwten, droog te oogsten bonen, graszaadteelt, blauwmaanzaad, luzerne, veldboon (voor ensilage), aalbes, kruisbes, braam, framboos, sla, andijvie, veldsla, postelein, boon met peul, boon zonder peul, erwt zonder peul, sluitkool, spruitkool, bloemkoolachtigen, koolraap, rode biet en kruidenteelt vers of gedroogd in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik gemaakt wordt van een van de volgende driftreducerende maatregelen:

- minimaal 95% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 0,5 meter
- spuitboomverlaging (30 cm) in combinatie met luchtondersteuning in combinatie met een teeltvrije zone van 0,5 meter
- Hardi Twin Force met luchtondersteuning en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 0,5 meter

- Släpduksysteem en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 0,5 meter
- Wingsprayer en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 0,5 meter
- een overkapte beddenspuit in combinatie met een teeltvrije zone van 0,5 meter
- luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 0,5 meter

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de onbedekte teelten van pootaardappel, consumptieaardappel, zetmeelaardappel, broccoli, Chinese kool, amsoi, paksoi, wortelen in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik gemaakt wordt van een van de volgende driftreducerende maatregelen:

- minimaal 95% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 1,0 meter
- spuitboomverlaging (30 cm) in combinatie met luchtondersteuning in combinatie met een teeltvrije zone van 1,0 meter
- Hardi Twin Force met luchtondersteuning en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 1,0 meter
- Släpduksysteem en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 1,0 meter
- Wingsprayer en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 1,0 meter
- een overkapte beddenspuit in combinatie met een teeltvrije zone van 1,0 meter
- luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 1,0 meter

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de **onbedekte teelten** van wintertarwe, wintergerst, zomertarwe, zomergerst, appel, peer, kers, pruim, perzik, aardbei, koolrabi en spinazie, in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien:

- in de onbedekte teelt van appel, peer, kers, pruim en perzik uitsluitend vanaf 1 mei wordt toegepast en gespoten wordt met een KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen en ventilatorstand "laag" in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter
- in de onbedekte teelt van wintergerst, wintertarwe, zomergerst, zomertarwe, aardbeien, spinazie en koolrabi het middel maximaal 1 keer wordt toegepast en gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen

Vanaf 1 januari 2018 is het in de bedekte teelten niet toegestaan om ongezuiverd afvalwater te lozen. Het te lozen afvalwater mag uitsluitend op het oppervlaktewater of riool worden geloosd, nadat het door een goed werkende zuiveringsvoorziening is geleid die tenminste 95% van de werkzame stof uit deze afvalwaterstroom verwijdert.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van bestuivers over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

12236 N

Behandelde soja niet voor oliewinning bestemmen.