

CropGuard Propyzamide 400, 15108N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegeestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings- gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden
Winter-koolzaad	na opkomst	eenjarige onkruiden	1,9 l/ha	1 per teeltcyclus
Luzerne	na opkomst tijdens de rust-periode	eenjarige onkruiden	1,9 l/ha	1 per 12 maanden
Witlof (pennenteelt)	voor opkomst, na opkomst of na planten	eenjarige onkruiden	3,75 l/ha	1 per teeltcyclus
Cichorei	voor opkomst, na opkomst of na planten	eenjarige onkruiden	3,75 l/ha	1 per teeltcyclus
Appel	Stroken-behandel-ing na de pluk	kweek ¹	2,5 L/ha zwartstrook	1 per 12 maanden
Peer	Stroken-behande-ling na de pluk	kweek ¹	2,5 L/ha zwartstrook	1 per 12 maanden
Sla (<i>Lactuca</i> spp) (onbedekte teelt)	voor opkomst of na planten	eenjarige onkruiden	2,5-3,75 l/ha ²	1 per teeltcyclus
Andijvie (onbedekte teelt)	voor opkomst of na planten	Eenjarige onkruiden	2,5-3,75 l/ha ²	1 per teeltcyclus
Snijbloemen (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige onkruiden	2,5-3,75 l/ha ²	1 per 12 maanden

Toepassings- gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden
Chrysant (onbedekte teelt)	na uitplanten	eenjarige onkruiden	3,75 l/ha	1 per 12 maanden
Boomkwekerij-gewassen (onbedekte teelt)	voor opkomst of na planten	eenjarige onkruiden	2,5-3,75 l/ha ²	1 per 12 maanden
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	na planten	eenjarige onkruiden	2,5-3,75 l/ha ²	1 per 12 maanden
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige onkruiden	2,5-3,75 l/ha ²	1 per 12 maanden
Houtige beplanting	na planten	eenjarige onkruiden	2,5-3,75 l/ha ²	1 per 12 maanden

¹ Kweek (*Elymus repens*)

² Dosering is afhankelijk van de grondsoort

Het gebruik in de onbedekte teelt van witlof (pennenteelt), chicorei, pitvruchten (m.u.v. appel en peer), steenvruchten, bessen, druif, braam- en framboosachtigen, schorseneer, rabarber, valeriaan is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassings- gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepas- singen in dagen
Witlof (pennenteelt)	voor opkomst, na opkomst of na planten	eenjarige onkruiden	0,25-2,5 l/ha*	5 per teeltcyclus	3,75 l/ha per teeltcyclus	5
Cichorei	voor opkomst, na opkomst of na planten	eenjarige on- kruiden	0,25-2,5 l/ha*	5 per teeltcyclus	3,75 l/ha per teeltcyclus	5
Pitvruchten (m.u.v. appel, peer)	Stroken-behandeling na de pluk	kweek ¹	2,5 L/ha zwartstrook	1 per 12 maanden	2,5 L/ha zwartstrook per 12 maanden	-
Steenvruchten (onbedekte teelt)	Stroken-behandeling na de pluk	kweek ¹	2,5 L/ha zwartstrook	1 per 12 maanden	2,5 L/ha zwartstrook per 12 maanden	-
Bessen (onbedekte teelt)	Stroken-behandeling na de pluk	Eenjarige on- kruiden	2,5 L/ha zwartstrook	1 per 12 maanden	2,5 L/ha zwartstrook per 12 maanden	-
Druif (onbedekte teelt)	Stroken-behandeling na de pluk	Eenjarige on- kruiden	2,5 L/ha zwartstrook	1 per 12 maanden	2,5 L/ha zwartstrook per 12 maanden	-
Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.) (onbedekte teelt)	Stroken-behandeling na de pluk	Eenjarige on- kruiden	2,5 L/ha zwartstrook	1 per 12 maanden	2,5 L/ha zwartstrook per 12 maanden	-
Schorseneer	Voor zaai of voor opkomst	Een-jarige on- kruiden	1,875 l/ha	1 per teeltcyclus	1,875 L/ha per teeltcyclus	-
Rabarber (onbedekte teelt)	tijdens de vegetatieve rustperiode	Een-jarige on- kruiden	2,8-3,1 l/ha	1 per teeltcyclus	3,1 L/ha per teeltcyclus	-
Valeriaan	na planten	Eenjarige on- kruiden	1.25 l/ha	1 per teeltcyclus	1,25 l/ha per teeltcyclus	-

*in LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen

Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van witlof (pennenteelt) en cichorei dient maximaal 3,75 l/ha middel per teeltcyclus te worden toegepast.

Dit middel dient niet handmatig te worden toegepast in openbare aanplant.

In verband met de lange verblijfsduur van het middel in de grond moet rekening worden gehouden met kans op schade aan eventuele volgteelten. Het inzaaien van granen, grassen en het planten van bloembollen als volgteelt van cichorei en witlof, dat behandeld is geweest met dit middel wordt dan ook ontraden. Na vroeg geoogste cichorei of witlof is ook geen volgteelt van spinazie mogelijk, vanwege kans op schade.

Voor de toepassing in de teelt van boomkwekerijgewassen, in de onbedekte teelt van snijbloemen, in de onbedekte vaste plantenteelt en de onbedekte bloemenzaadteelt dient het volgende in acht genomen te worden: Indien nog geen ervaring in een bepaald gewas is opgedaan met het middel, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden teneinde de verdraagzaamheid van het gewas te testen.