

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 25 november 2011 tot herregistratie van de toelating van het middel Trimangol 80 WP, toelatingnummer 5928 N

A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in:

- a. de teelt van pootaardappelen, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen;
- b. de teelt van winter- en zomertarwe;
- c. de teelt van 1^e-jaars plantuien, 2^e-jaars plantuien, picklers, zaaiuien, zilveruien en sjalotten;
- d. in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen.

Om de vogels te beschermen is toepassing in teelt van pootaardappelen, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen en uien uitsluitend toegestaan vanaf BBCH 40, wanneer knol- of bolvorming begint, en met een minimum interval van 10 dagen tussen de toepassingen.

Dit middel is schadelijk voor natuurlijke vijanden. Vermijd onnodige blootstelling.

Het is niet toegestaan dit middel door middel van een luchtvaartuig toe te passen.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Veiligheidstermijnen

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:

28 dagen: voor 1^e-jaars plantuien, 2^e-jaars plantuien, picklers, zaaiuien, zilveruien en sjalotten

42 dagen: voor winter- en zomertarwe

B.
GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassingen

Poot-, consumptie- en zetmeelaardappelen, ter voorkoming van loofaantasting door de aardappelziekte (*Phytophthora infestans*).

Het tijdstip van de eerste behandeling hangt af van de ontwikkeling van het gewas, de vatbaarheid van het ras, de weersomstandigheden en de infectiedruk. Afhankelijk van de snelheid van de ontwikkeling van het gewas, de weersomstandigheden en de infectiedruk, de bespuitingen om de 10 dagen herhalen. Maximaal 8 toepassingen per teeltseizoen.

Dosering: 2 kg middel per ha

Bij voor *Phytophthora* gunstige omstandigheden overgaan op andere voor de *Phytophthora*-bestrijding in aardappelen toegelaten middelen, teneinde een goede bescherming van de knol te verkrijgen. Dit geldt met name voor in het loof en knol vatbare rassen.

Winter- en zomertarwe, ter bestrijding van *Septoria* spp.

Toepassen vanaf begin aantasting met een interval van 10-14 dagen gedurende de periode vanaf het verschijnen van de aren tot aan begin bloei. Maximaal 3 toepassingen per teeltseizoen.

Dosering: 2 kg middel per ha

Zaaiuien, 1^e-jaars plantuien, 2^e-jaars plantuien, picklers, zilveruien en sjalotten, ter bestrijding van valse meeldauw (*Peronospora destructor*).

Afhankelijk van de veldomstandigheden vanaf eind juni regelmatig toepassen met een interval van 10 dagen. Maximaal 5 toepassingen per teeltseizoen.

Dosering: 2 kg middel per ha

Bedekte teelt van Chrysanten, ter bestrijding van Chrysantenroest (*Puccinia horiana*) en Pelargoniumroest (*Puccinia pelargonii-zonalis*).

Vanaf het planten in verband met de kans op het ontstaan van teveel zichtbaar residu maximaal 3 à 4 keer preventief toepassen met een interval van 7 dagen.

Dosering: 0,3% (300 gram middel per 100 liter water).

Bedekte teelt van bloemisterijgewassen, ter bestrijding van Japanse roest (*Puccinia horiana*) en Pelargoniumroest (*Puccinia pelargonii-zonalis*).

Preventief toepassen met een interval van 7 dagen. Zowel de onderkant als de bovenkant van de bladeren moet grondig bespoten worden. Zorg voor lage luchtvochtigheid in de kas.

Om zichtbaar residu op het oogstproduct te voorkomen ruim (4 weken) voor het oogsttijdstip stoppen met de bespuitingen of overgaan op andere producten.

Dosering: 0,3% (300 gram middel per 100 liter water).