

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Actueel WG van het middel Fantic M, 14070 N

W.1

3 mei 2016

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Consumptieaardappel	Aardappelziekte ¹	2,5 kg/ha	3	7	7 dagen
Zetmeelaardappel	Aardappelziekte ¹	2,5 kg/ha	3	7	7 dagen

¹ Aardappelziekte (*Phytophthora infestans*)

Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van consumptieaardappel en zetmeelaardappel dient Fantic M verspoten te worden met een volume van 200 – 400L water per ha.

Eerst de tank voor de helft vullen met water, vervolgens onder voortdurend roeren het middel toevoegen en de tank verder met water vullen. Tijdens het verspuiten moet de spuitvloeistof in beweging worden gehouden.

Om de vogels en zoogdieren te beschermen is toepassing in teelt van consumptieaardappel en zetmeelaardappel uitsluitend toegestaan vanaf BBCH 40 (sluiting van het gewas).

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen benalaxyl-M en mancozeb. Benalaxyl-M behoort tot de acylalaninen. De Frac code is 4. Mancozeb behoort tot de dithiocarbamaten. De Frac code is M3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Daar er tussen benalaxyl-M en verwante stoffen kruisresistentie bestaat, dienen bespuitingen met aan benalaxyl-M verwante stoffen in hetzelfde seizoen te worden vermeden.

Het middel vroeg in het seizoen toepassen als het gewas nog in volle ontwikkeling is (voor de bloei, BBCH 60). Het verdient daarbij aanbeveling de eerste bespuiting uit te voeren met een ander geschikt middel. Niet toepassen op gewassen met stagnerende groei en op gewassen waar een aantasting zichtbaar is (i.v.m. resistentie).