

**HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN****W.1**

Actueel WG van het middel Pirimor SG

21 april 2017

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een ruimtebehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardbei (bedekte teelt)	bladluis	1 rook-ontwikkelaar per 400 m <sup>2</sup>	2,5 kg/ha	2	7	3
Sla ( <i>Lactuca</i> spp.) (bedekte teelt)	bladluis	1 rook-ontwikkelaar per 400 m <sup>2</sup>	2,5 kg/ha	2	10	10
Andijvie (bedekte teelt)	bladluis	1 rook-ontwikkelaar per 400 m <sup>2</sup>	2,5 kg/ha	2	10	21
Veldsla (bedekte teelt)	bladluis	1 rook-ontwikkelaar per 400 m <sup>2</sup>	2,5 kg/ha	2	10	10
Augurk (bedekte teelt)	bladluis	1 rook-ontwikkelaar per 250-400 m <sup>2</sup>	4 kg/ha	2	10	1
Courgette (bedekte teelt)	bladluis	1 rook-ontwikkelaar per 250-400 m <sup>2</sup>	4 kg/ha	2	10	1
Komkommer	bladluis	1 rook-ontwikkelaar per 250-400 m <sup>2</sup>	4 kg/ha	2	10	1
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met niet-eetbare schil (bedekte teelt)	bladluis	1 rook-ontwikkelaar per 250-400 m <sup>2</sup>	4 kg/ha	2	7	3
Tomaat	bladluis	1 rook-ontwikkelaar per 250-400 m <sup>2</sup>	4 kg/ha	2	10	1
Aubergine	bladluis	1 rook-ontwikkelaar per 250-400 m <sup>2</sup>	4 kg/ha	2	10	1
Paprika	bladluis	1 rook-ontwikkelaar per 250-400 m <sup>2</sup>	4 kg/ha	2	7	1
Spaanse peper	bladluis	1 rook-ontwikkelaar per 250-400 m <sup>2</sup>	4 kg/ha	2	7	1

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Kruidenteelt vers of gedroogd (bedekte teelt)	bladluis	1 rook-ontwikkelaar per 400 m <sup>2</sup>	2,5 kg/ha	2	10	10
Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte teelt)	bladluis	1 rook-ontwikkelaar per 400 m <sup>2</sup>	2,5 kg/ha	2	7	-
Bloembol- en bloemknolgewassen (bewaarplaatsen)	bladluis	1 rook-ontwikkelaar per 700 m <sup>3</sup>	-	2	7	-
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	bladluis	1 rook-ontwikkelaar per 400 m <sup>2</sup>	2,5 kg/ha	2	7	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	bladluis	1 rook-ontwikkelaar per 400 m <sup>2</sup>	2,5 kg/ha	2	7	-
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	bladluis	1 rook-ontwikkelaar per 400 m <sup>2</sup>	2,5 kg/ha	2	7	-

### Toepassingsvoorwaarden

De behandelde ruimte moet 3 tot 6 uur na het roken gesloten blijven. Behandelde ruimten gedurende deze tijd niet betreden. Draag een gasmasker indien de kas betreden moet worden. Niet toepassing met brandende CO<sub>2</sub>-apparatuur.

Vanaf 1 januari 2018 is het in de bedekte teelten niet toegestaan om ongezuiverd afvalwater te lozen. Het te lozen afvalwater mag uitsluitend op het oppervlaktewater of riool worden geloosd, nadat het door een goed werkende zuiveringsvoorziening is geleid die tenminste 95% van de werkzame stof uit deze afvalwaterstroom verwijdert.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van bestuivers over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Dit middel is gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.