

**BIJLAGE I** bij het besluit d.d. 2 november 2012 tot toelating van het middel Grisu, toelatingnummer 13850 N.

A.  
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel, toegepast door middel van een gewasbehandeling in:

- a. de teelt van koolzaad;
- b. in de bedekte niet-grond gebonden teelt van tomaat.

Bij de interpretatie van wat valt onder bovengenoemde teelten is uitgegaan van de definitielijst toepassingsgebieden gewasbeschermingsmiddelen, versie 2.0, Ctgb juni 2011.

Veiligheidstermijn:

De termijn tussen de laatste behandeling en de oogst mag niet korter zijn dan:

56 dagen voor koolzaad  
3 dagen voor tomaat

resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof iprodion. Iprodion behoort tot de dicarboximiden. De Frac code is 2. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

*Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in onbedekte teelten in grondwaterbeschermingsgebieden.*

*Om in de water levende organismen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van 75% driftreducerende spuitdoppen.*

*Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.*

B.  
GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassingen

Koolzaad

Maximaal 1 behandeling per teelt uitvoeren.

*ter bestrijding van Alternaria.*

Preventief toepassen tussen halverwege en einde bloei (BBCH 62-69).

Dosering: 1,0 liter middel per ha in 200-600 liter water

Bedekte niet-grond gebonden teelt van tomaat.

Maximaal 4 keer per teelt toepassen.

*ter bestrijding van Alternaria.*

Toepassen vanaf begin bloei van de tweede tros of op het moment dat de omstandigheden gunstig zijn voor het optreden van de ziekte. De behandelingen herhalen met een interval van 10-14 dagen.

Dosering: 1,0 liter middel per ha in 600-1000 liter water

*ter bestrijding van grauwe schimmel (Botrytis cinerea).*

Toepassen vanaf begin bloei van de tweede tros of op het moment dat de omstandigheden gunstig zijn voor het optreden van de ziekte. De behandelingen herhalen met een interval van 7-14 dagen.

Dosering: 1,0 liter middel per ha in 600-1000 liter water