

## HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

**BIJLAGE I** bij het wijzigingsbesluit van de toelating van het middel  
DIMILIN Spuitpoeder 25% voor de Veehouderij, toelatingsnummer 11543 N

### A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van vliegenlarven in verblijfplaatsen van rundvee, varkens en pluimvee, mits het wordt toegepast door:

- personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door een door de Minister van VROM geregistreerde instelling of geregistreerd bedrijf en dat niet ouder is dan vijf jaren, of
- personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs van gelijkstelling dan wel een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren
- agrarische ondernemers die het middel op eigen bedrijf gebruiken.

### B. GEBRUIKSAANWIJZING

#### **Algemeen**

DIMILIN Spuitpoeder 25% voor de veehouderij is werkzaam tegen de larvale stadia van verschillende insectensoorten. In een aantal gevallen voorkomt het middel ook het uitkomen van de eieren.

Het middel heeft een trage aanvangswerking. Om schade te voorkomen is daarom een tijdige toepassing gewenst, dat wil zeggen op eieren of jonge larven.

#### Toepassingen

Verblijfplaatsen van rundvee (inclusief melkvee), varkens en pluimvee, ter bestrijding van vliegenlarven (*Musca domestica*, *Fannia canicularis* en *Stomoxys calcitrans*).

Toepassen op plaatsen waar verse mest ligt en op mest in kelders.

Dosering:

- in gesloten stallen:	20 g per 10 m <sup>2</sup> ;
- in open stallen:	40 g per 10 m <sup>2</sup> ;
- in pluimveestallen met snelle mestophoping:	10 g per 10 m <sup>2</sup> ;

Opmerkingen:

- Aangezien het middel alleen werkzaam is tegen vliegenlarven, dienen voor een directe bestrijding van eventueel aanwezige volwassen vliegen andere toegelaten middelen te worden gebruikt.
- Doorgaans dient de toepassing om de 5 á 6 weken te worden herhaald. In pluimveestallen met snelle mestophoping worden kortere intervallen aanbevolen (2 weken).

Het middel toepassen in 2-5 liter water per 10 m<sup>2</sup>.

Wageningen, 15 april 2005

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  
BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(secretaris/directeur)

