

31 mei 2018

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering middel per toepassing*	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
poot aardappel	overdracht van non-persistente virussen door bladluizen	6,25 l/ha ¹	12	Tussen 1 ^e en 2 ^e toepassing 3 dagen, tussen volgende toepassingen 7 dagen
bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt)	overdracht van non-persistente virussen door bladluizen	6,25 l/ha ¹	25	7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ in combinatie met een daarvoor toegelaten insectenbestrijdingsmiddel.

Overige toepassingsvoorwaarden

Mogelijk gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels alleen toepassen tussen zonsondergang en zonsopkomst.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen is toepassing in de teelten van poot aardappel en bloembollen en bloemknollen uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van minimaal 150 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij tot aan de perceelgrens/insteek van de sloot).

De werking kan variabel zijn. Dit middel kan bijdragen aan de beheersing van overdracht van virussen.

In poot aardappel en bloembollen en bloemknollen is opbrengstderving ten gevolge van de bespuitingen mogelijk.