

Farao, 16231 N

28 mei 2021

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel - voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus
Tulp (onbedekte teelt)	Grondbehandeling** (voor planten)	Rhizoctonia-ziekte ¹	6 L/ha	6 L/ha	1	6 L/ha
	Voorbehandeling*** (tijdens planten)		3 L/ha	3 L/ha	1	
Iris (onbedekte teelt)	Grondbehandeling** (voor planten)	Rhizoctonia-ziekte ¹	6 L/ha	6 L/ha	1	6 L/ha
	Voorbehandeling*** (tijdens planten)		3 L/ha	3 L/ha	1	

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** Het middel (volvelds) verspuiten en direct daarna 10-15 cm inwerken met daartoe geëigende apparatuur.

*** Het middel verspuiten over de geplante bollen in de opengetrokken plantregel waarbij ook de dekgrond (opstaande regelwanden) moet worden behandeld.

¹ Rhizoctonia-ziekte (*Rhizoctonia solani*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform de "vereenvoudigde uitbreidingsprocedure". Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytoxiciteit onderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie, tulp en iris (onbedekte teelt)	Grondbehandeling** (voor planten)	Rhizoctonia-ziekte ¹	6 L/ha	1	6 L/ha
	Voorbehandeling*** (tijdens planten)		3 L/ha	1	
Snijbloemen (grondgebonden teelt)	Gewasbehandeling (kort na planten)	Rhizoctonia-ziekte ¹	6 L/ha	1	6 L/ha
Trekheesters	Gewasbehandeling (kort na planten)	Rhizoctonia-ziekte ¹	6 L/ha	1	6 L/ha
Snijgroen	Gewasbehandeling (kort na planten)	Rhizoctonia-ziekte ¹	6 L/ha	1	6 L/ha
Sierheesters	Gewasbehandeling (kort na planten)	Rhizoctonia-ziekte ¹	6 L/ha	1	6 L/ha
Vaste plantenteelt	Gewasbehandeling (kort na planten)	Rhizoctonia-ziekte ¹	6 L/ha	1	6 L/ha
Bloemenzaadteelt	Gewasbehandeling (kort na planten)	Rhizoctonia-ziekte ¹	6 L/ha	1	6 L/ha

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

** Het middel (volvelds) verspuiten en direct daarna 10-15 cm inwerken met daartoe geëigende apparatuur.

*** Het middel verspuiten over de geplante bollen in de opengetrokken plantregel waarbij ook de dekgrond (opstaande regelwanden) moet worden behandeld

¹Rhizoctonia-ziekte (*Rhizoctonia solani*).

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van snijbloemen, trekheesters, snijgroen, sierheesters, vaste planten en bloemenzaad het middel toepassen met 400-1000 liter water per hectare.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw

adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.