

Bombero, 15571 N**Ingangsdatum 1 januari 2019**

23 maart 2018

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardbei (bedekte teelt)	Vruchtrot ¹	0,7-0,9 L/ha**	0,9 L/ha	2	7	3
Aardbei (onbedekte teelt)	Vruchtrot ¹	0,7-0,9 L/ha**	0,9 L/ha	2	7	3
	Echte meeldauw ²	0,9 L/ha				
Bloembol- en bloemknolgewassen	Vuur ³	0,35 L/ha ***	0,35 L/ha	10	7	-
Bloemisterijgewassen	Echte meeldauw ⁴	0,09% (90 gram middel per 100 liter water) ****	0,9 L/ha	2	7	-

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Boomkwekerijgewassen (m.u.v. opzetters bij laanbomen)	Echte meeldauw ⁴	0,09% (90 gram middel per 100 liter water) ****	0,9 L/ha	2	7	-
Vaste plantenteelt	Echte meeldauw ⁴	0,09% (90 gram middel per 100 liter water) ****	0,9 L/ha	2	7	-
Bloemenzaadteelt	Echte meeldauw ⁴	0,09% (90 gram middel per 100 liter water) ****	0,9 L/ha	2	7	-
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen	Echte meeldauw ⁴	0,09% (90 gram middel per 100 liter water) ****	0,9 L/ha	2	7	-
Openbaar groen en particuliere tuinen	Echte meeldauw ⁴	0,9 L/ha ****	0,9 L/ha	2	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** Indien de omstandigheden minder gunstig zijn voor het optreden van vruchtrot (droge periode en lage temperaturen), dan kan worden volstaan met een lagere dosering van 0,7 liter per hectare

*** In combinatie met een preventief werkend fungicide

**** In combinatie met een uitvloeier.

¹ Vruchtrot (*Botrytis cinerea*/*Botryotinia fuckeliana*)

² Echte meeldauw (*Sphaerotheca aphanis*/*Podospaera aphanis*)

³ Vuur (*Botrytis* spp.)

⁴ Echte meeldauw (*Sphaerotheca* spp.; *Microsphaera* spp.; *Oidium* spp.)

Overige toepassingsvoorwaarden

Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden (*Trichogramma cacoeciae*). Vermijd onnodige blootstelling.