

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 13 februari 2015 tot wijziging van het middel Venture N, toelatingnummer 13822 N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings-gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassing en per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassing en in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Wintertarwe	Oogvlekkenziekte ¹ Echte meeldauw ² Bladvlekkenziekten ^{3, 4} Bruine roest ⁶ Gele roest ⁷	2,5 L/ha *	2	21	35
Wintergerst	Oogvlekkenziekte ¹ Echte meeldauw ² Bruine roest ⁶ Gele roest ⁷ Netvlekkenziekte ⁸ Bladvlekkenziekten ^{9,10}	2,5 L/ha *	2	21	35
Winterrogge	Oogvlekkenziekte ¹ Bruine roest ⁶ Gele roest ⁷ Meeldauw ² Bladvlekkenziekte ⁹	2,5 L/ha *	2	21	35
Triticale	Oogvlekkenziekte ¹ Echte meeldauw ² Bladvlekkenziekten ^{3, 4} Bruine roest ⁶ Gele roest ⁷	2,5 L/ha *	2	21	35

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassing en per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassing en in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Zomertarwe	Oogvlekkenziekte ¹ Echte meeldauw ² Bladvlekkenziekten ^{3, 4} Bruine roest ⁶ Gele roest ⁷	2,5 L/ha *	2	21	35
Zomergerst	Oogvlekkenziekte ¹ Echte meeldauw ² Bruine roest ⁶ Gele roest ⁷ Netvlekkenziekte ⁸ Bladvlekkenziekten ^{9,10}	2,5 L/ha *	2	21	35
Haver	Oogvlekkenziekte ¹ Echte meeldauw ² Kroonroest ¹¹	2,5 L/ha *	2	21	35

¹*Pseudocercospora herpotrichoides*;

²*Erysiphe graminis* / *Blumeria graminis*;

³*Septoria tritici*;

⁴*Septoria nodorum*;

⁶*Puccinia recondita*;

⁷*Puccinia striiformis*;

⁸*Pyrenophora teres*;

⁹*Rhynchosporium secalis*;

¹⁰*Ramularia collo-cygni*;

¹¹*Puccinia coronata*.

* toepassen met 150-300 liter water per ha.

Toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing op perceelsranden die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen epoxicanazool en boscalid. Epoxicanazool behoort tot de strobilurinen. De Frac code is 3. Boscalid behoort tot de carboxamiden. De Frac code is 7. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.