

2 mei 2014 tot toelating van het middel Clinic Ace, toelatingnummer 14446 N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als:

- onkruidbestrijdingsmiddel
 - doodspuitmiddel
 - middel voor de behandeling van uitlopers van bomen en struiken
 - middel voor de behandeling van stobben van afgezaagde bomen en struiken
- in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgj juli 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings-Gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Doserin g (middel) per toepassing	Maximal e dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassing en per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheids-termijn in dagen
wintertarwe	op afgerijpt gewas (BBCH 85)	Onkruid	3-4 l/ha	4 l/ha	1x per teeltcyclus	7
Wintergerst	op afgerijpt gewas (BBCH 85)	Onkruid	3-4 l/ha	4 l/ha	1x per teeltcyclus	7
Winterrogge	op afgerijpt gewas (BBCH 85)	Onkruid	3-4 l/ha	4 l/ha	1x per teeltcyclus	7
Triticale	op afgerijpt gewas (BBCH 85)	Onkruid	3-4 l/ha	4 l/ha	1x per teeltcyclus	7
Spelt	op afgerijpt gewas (BBCH 85)	Onkruid	3-4 l/ha	4 l/ha	1x per teeltcyclus	7
Zomertarwe	op afgerijpt gewas (BBCH 85)	Onkruid	3-4 l/ha	4 l/ha	1x per teeltcyclus	7
Zomergerst	op afgerijpt gewas (BBCH 85)	Onkruid	3-4 l/ha	4 l/ha	1x per teeltcyclus	7

Toepassings-Gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Doserin g (middel) per toepassing	Maximal e dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassing en per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheids-termijn in dagen
Haver	op afgerijpt gewas (BBCH 85)	Onkruid	3-4 l/ha	4 l/ha	1x per teeltcyclus	7
Peulvruchten	op afgerijpt gewas (BBCH 85)	Onkruid	3-4 l/ha	4 l/ha	1x per teeltcyclus	7
voedergrasland, waarin geen vee aanwezig is	doodspuiten	gras en onkruid	4-7 l/ha	7 l/ha	1x per 12 maanden	5
Gazon	doodspuiten	gras en onkruid	4-7 l/ha	7 l/ha	1x per 12 maanden	-
Sportveld	doodspuiten	gras en onkruid	4-7 l/ha	7 l/ha	1x per 12 maanden	-
Kerstbomen	over het gewas	kweek ¹	4 l/ha	4 l/ha	1x per 12 maanden	-
		distel, brandnetel en varens ²	6 l/ha	6 l/ha		
tijdelijk onbeteeld terrein en onverhard permanent onbeteeld terrein	-	Eenjarige onkruiden	2-4 l/ha	4 L/ha	1x per 12 maanden	7
		Kweek en zuring ³	4 L/ha	4 L/ha		
		Distel, bijvoet, boterbloem, weegbree, brandnetel, basterdwederik, wilgenroosje, samengesteld bloemige onkruiden, barmen en varens ⁴	6 l/ha	6 L/ha		
		Berenklauw, akkermelkdistel, akkerwinde, haagwinde en klein hoefblad ⁵	7-8 l/ha	8 l/ha		

Toepassings- Gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Doserin g (middel) per toepassi ng	Maximal e dosering (middel) per toepassi ng	Maximaal aantal toepassing en per teeltcyclus of per 12 maanden	Veilighei ds- termijn in dagen
		Japane duizendknoo p ⁶	9-10 l/ha	10 L/ha		
tijdelijk onbeteeld terrein en onverhard permanent onbeteeld terrein	aanstrijke n of pleksgewi js	scheuten van uitlopers van bomen of struiken	1,2% (12 ml in 1 liter water)	6 l/ha	1x per 12 maanden	7
tijdelijk onbeteeld terrein en onverhard permanent onbeteeld terrein	aanstrijke n	stronken	2% (20 ml in 1 liter water)	10 l/ha	1x per 12 maanden	7
akkerbouwgewas sen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewasse n	aanstrijke n	Onkruid ⁷	35-55% (350- 550 ml in 1 l water)	6 l/ha	1x per 12 maanden	-

¹ *Agropyrens repens*

² *Cirsium spp.*, *Carduus spp* *Urtica spp.* en *Filicopsida spp.*

³ *Agropyrens repens* en *Rumex spp.*

⁴ *Artemisia vulgaris*, *Carduus spp.*, *Chamerion angustifoliu*, *Cirsium spp.*, *Epilobium adnatum*, *Filicopsida spp.*, *Plantago spp.*, *Ranunculus spp.*, *Rubus fruticosus* en *Urtica spp.*

⁵ *Convolvulus arvensis*, *Convolvulus sepium*, *Heracleum sphondylium*, *Sonchus arvensi* en *Tussilago farfara*.

⁶ *Polygonum cuspidatum*

⁷ Met behulp van onkruidstrijkers, mits de toepassing zodanig plaatsvindt dat het gewas niet wordt geraakt met het middel, de apparatuur niet druipt en de vloeistof niet van de behandelde onkruiden afloopt.

Toepassingsvoorwaarden

Het product mag niet worden gebruikt op gewassen voor zaadproductie.

Dit middel mag niet worden toegepast op open, halfopen en gesloten verhardingen.

Bij de toepassing op tijdelijk onbeteeld terrein mogen sloottaluds niet gespoten worden.

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

In kerstbomen geldt dat het gewas tenminste 2 jaar oud moet zijn.

Bij toepassing op voedergrasland, waarin geen vee aanwezig is, een termijn van 5 dagen aanhouden voor beweiden of inkuilen.

Bij toepassing op tijdelijk onbeteeld terrein en onverhard permanent onbeteeld terrein een termijn van 7 dagen aanhouden voor uitzaai of planten.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, spelt, zomertarwe, zomergerst, haver, peulvruchten, voedergrasland, gazons en sportvelden uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% drift reducerende spuitdoppen.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing op tijdelijk onbeteeld terrein en onverhard permanent onbeteeld terrein uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% drift reducerende spuitdoppen.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing in de teelt van kerstbomen uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van andere technieken dan de Agricult LVS techniek (zoals standaard spuittechnieken met of zonder driftreducerende doppen en afgeschermdde spuiten) in combinatie met een teeltvrije zone van 5 meter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij).