

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 4 mei 2012 tot parallelle toelating van het middel Budget Methoxyfenozide 240 SC, toelatingnummer 13679 N

A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in de teelt van

- a. appel en peer
- b. aubergine, paprika, Spaanse peper en tomaat onder glas
- c. bloemisterijgewassen
- d. boomkwekerijgewassen en vaste planten

In de buitenteelt mag voor 1 mei slechts één toepassing plaatsvinden.

De toepassing van dit middel in grondwaterbeschermingsgebieden is niet toegestaan.

Veiligheidstermijn

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan 1 dag voor aubergine, paprika, Spaanse peper en tomaat
14 dagen voor appel en peer.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

Budget Methoxyfenozide 240 SC is een insecticide met voornamelijk een contactwerking dat de rupsen aanzet tot vervelling.

Toepassingen

Appel en peer, ter bestrijding van de rupsen van onder andere de vruchtbladroller (*Adoxophyes orana*)

Bij aanwezigheid van de rupsen in het voorjaar voor de bloei een gewasbehandeling uitvoeren op de rupsen die zich na de overwintering gaan inspinnen in de jonge bladeren en in bloesems. In de zomer (circa juni) kan ook een behandeling worden uitgevoerd bij aanwezigheid van rupsen van de zomergeneratie.

Dosering: 0,04% (40 ml per 100 liter water)

Appel en peer, ter bestrijding van de rupsen van o.a. de kleine wintervlinder (*Operopthera brumata*)

Bij aanwezigheid van rupsen van de kleine wintervlinder in het voorjaar rond de bloei een gewasbehandeling uitvoeren.

Dosering: 0,04% (40 ml per 100 liter water)

Aubergine, paprika, Spaanse peper en tomaat onder glas, ter bestrijding van rupsen van onder andere de Floridamot (*Spodoptera exigua*) en de Turkse mot (*Chrysodeixis calchites*)

Zodra aantasting wordt waargenomen twee bespuitingen uitvoeren met een interval van 7-10 dagen. Bij een zware aantasting een interval van 7 dagen aanhouden.

Dosering: 0,04% (40 ml per 100 l water)

Bloemisterijgewassen, ter bestrijding van rupsen van onder andere de Floridamot (*Spodoptera exigua*) en de Turkse mot (*Chrysodeixis calchites*)

Zodra aantasting wordt waargenomen twee bespuitingen uitvoeren met een interval van 7-10 dagen. Bij een zware aantasting een interval van 7 dagen aanhouden.

Dosering: 0,04% (40 ml per 100 l water)

Boomkwekerijgewassen en vaste planten ter bestrijding van rupsen van onder andere de kleine wintervlinder (*Operopthera brumata*).

Bij aanwezigheid van rupsen in het voorjaar een gewasbehandeling uitvoeren.

Dosering: 0,04% (40 ml per 100 liter water)

Attentie:

Indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden teneinde de verdraagzaamheid van het gewas te testen.