

**PROXYRAL, 14998 N**

13 november 2015

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil (bedekte teelt)	wittevlieg <sup>1</sup>	0,025% (25 ml per 100 L water)	0,375 L/ha	2 per teeltcyclus	10	3
Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> (bedekte teelt)	wittevlieg <sup>1</sup>	0,025% (25 ml per 100 L water)	0,375 L/ha	2 per teeltcyclus	10	3
Bloemisterijgewassen met meerdere teeltcycli per jaar (bedekte teelt)	wittevlieg <sup>1</sup>	0,025% (25 ml per 100 L water)	0,25 L/ha	1 per teeltcyclus (max 5 per 12 maanden)	-	-
Bloemisterijgewassen, m.u.v. Poinsettia en roos met één- of meerjarige teelt (bedekte teelt)	wittevlieg <sup>1</sup>	0,025% (25 ml per 100 L water)	0,25 L/ha	2 per 12 maanden	7	-
Poinsettia (bedekte teelt)	wittevlieg <sup>1, 2</sup>	0,025% (25 ml per 100 L water)	0,25 L/ha	2 per 12 maanden	7	-
Roos (bedekte teelt)	wittevlieg <sup>1</sup>	0,025% (25 ml per 100 L water)	0,3 L/ha	2 per 12 maanden	7	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	wittevlieg <sup>1</sup>	0,025% (25 ml per 100 L water)	0,25 L/ha	2 per 12 maanden	7	-

Toepassings- gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepas- sing	Maximale dosering (middel) per toepas- sing	Maximaal aantal toepas- singen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepas- singen in dagen	Veilig- heids- termijn in dagen
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	wittevlieg <sup>1</sup>	0,025% (25 ml per 100 L water)	0,25 L/ha	2 per 12 maanden	7	-

<sup>1</sup> Kaswittevlieg (*Trialeurodes vaporariorum*)

<sup>2</sup> Tabakswittevlieg (*Bemisia tabaci*)

### Toepassingsvoorwaarden

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.