

Koromite

W.1

12 mei 2017

Ingangsdatum 1 januari 2018.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling (Definitielijst termen Wettelijke gebruiksvoorschriften) in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0 Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassings-Gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbei (onbedekte teelt)	Mijten ¹	0,05% (50 ml per 100 l water)	0,5 l/ha	2 per 12 maanden	1 l/ha	7
Dahliaknollen	Mijten ¹	0,05% (50 ml per 100 l water)	0,5 l/ha	2 per 12 maanden	1 l/ha	7
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	Mineervlieg ²	0,1% (100 ml per 100 l water)	1 l/ha	3 per blok en 9 per 12 maanden	9 l/ha	7 dagen binnen een blok en 28 dagen tussen twee blokken
	Mijten ¹	0,05% (50 ml per 100 l water)	0,5 l/ha	5 per 12 maanden		7
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Mijten ¹	0,05% (50ml per 100 l water)	0,5 l/ha	2 per 12 maanden	1 l/ha	7
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	Mijten ¹	0,05% (50ml per 100 l water)	0,5 l/ha	2 per 12 maanden	1 l/ha	7
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Mijten ¹	0,05% (50ml per 100 l water)	0,5 l/ha	2 per 12 maanden	1 l/ha	7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

¹ Spintmijten (*Tetranychus* spp.)

² Floridamineervlieg (*Liriomyza trifolii*), Nerfmineervlieg (*Liriomyza huibrensis*), Tomatenmineervlieg (*Liriomyza bryoniae*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Toepassing in aardbei is alleen toegestaan tot aan de bloei en na de pluk en in de vermeerdering van aardbeiplanten

Om in het waterlevende organismen te beschermen is toepassing op percelen grenzend aan oppervlaktewater s in de onderstaande teelten uitsluitend toegestaan indien gebruik gemaakt wordt van een van de aangegeven maatregelen:

in de onbedekte teelt van **aardbei**:

- Minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen met 4,3 meter teeltvrije zone
- Minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen met 1,5 meter (standaard) teeltvrije zone
- Minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen met 1,0 meter (standaard) teeltvrije zone

in de onbedekte teelt van **dahliaknollen**:

- Minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen met 4,4 meter teeltvrije zone
- Minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen met 1,5 meter (standaard) teeltvrije zone
- Minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen met 1,0 meter (standaard) teeltvrije zone;

In de onbedekte teel van **bloemisterijgewassen**:

- Minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen met 4,6 meter teeltvrije zone
- Minimaal 75% spuitdoppen met 0,5 meter (standaard) teeltvrije zone;

in de onbedekte teelt van **spillen**:

- teeltvrije zone van 8,9 meter met de axiaalspuit

in onbedekte teelt van overige neerwaarts gespoten **boomkwekerijgewassen** en **vaste planten**:

- Minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen met 4,8 meter teeltvrije zone
- Minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen met 1,5 meter (standaard) teeltvrije zone
- Minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen met 1,0 meter (standaard) teeltvrije zone

Dit middel is gevaarlijk voor niet-doelwitarthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.