

4 december 2015

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als wondafdekmiddel door middel van een pleksgewijze toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Maximaal aantal spuitbussen (inhoud 300 ml) per ha per teeltcyclus
Tomaat	Botrytis <sup>1</sup> Kanker <sup>2</sup>	0,5 -1 seconde	2 per wond	14	56

<sup>1</sup> *Botryotinia fuckeliana* / *Botrytis cinerea*

<sup>2</sup> *Didymella lycopersicum*

**Toepassingsvoorwaarden**

Vanaf 10-15 cm afstand gericht spuiten op de plaats waar een beginnende infectie aanwezig is.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Te lang of van te dichtbij spuiten kan fytotoxiciteit veroorzaken in de vorm van necrose.

Geen bladeren of vruchten raken en niet toepassen op jonge niet verhoude stengels (kans op verbranding van het gewas)

Resistentiemanagement

Dit product bevat de werkzame stof imazalil. Imazalil behoort tot de imidazolen, de FRAC code is 3. bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van het resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.