

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

28 juli 2015

Actueel WG van het middel Propi 25 EC, 14834 N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings- gebied	Te bestrijden Organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal behandelingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Wintertarwe	bruine roest ¹ gele roest ² kafjesbruin ³ <i>Cladosporium spp.</i>	0,5 l/ha	2 per teeltcyclus	14	35
Wintergerst	bruine roest ¹ gele roest ² <i>Cladosporium spp.</i>	0,5 l/ha	2 per teeltcyclus	14	35
Winterrogge	bruine roest ¹ gele roest ² echte meeldauw ⁴ <i>Cladosporium spp.</i>	0,5 l/ha	2 per teeltcyclus	14	35
Zomertarwe	bruine roest ¹ gele roest ² kafjesbruin ³ <i>Cladosporium spp.</i>	0,5 l/ha	2 per teeltcyclus	14	35
Zomergerst	bruine roest ¹ gele roest ² <i>Cladosporium spp.</i>	0,5 l/ha	2 per teeltcyclus	14	35

Toepassings- gebied	Te bestrijden Organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal behandelingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Haver	bruine roest ¹ gele roest ² echte meeldauw ⁴ kroonroest ⁵ <i>Cladosporium</i> spp.	0,5 l/ha	2 per teeltcyclus	14	35
Graszaadteelt	echte meeldauw ⁴ kroonroest ⁵ <i>Rhynchosporium</i> spp.	0,5 l/ha	2 per teeltcyclus	14	35
Cultuurgrasland	echte meeldauw ⁴ kroonroest ⁵ <i>Rhynchosporium</i> spp.	0,5 l/ha	1 per 12 maanden	-	28

¹ bruine roest (*Puccinia recondita*)

² gele roest (*Puccinia striiformis*)

³ kafjesbruin (*Phaeosphaeria nodorum*)

⁴ echte meeldauw (*Blumeria graminis*)

⁵ kroonroest (*Puccinia coronata*)

Toepassingsvoorwaarden

Propi 25 EC toepassen met 100-200 liter water per ha.

In de teelt van wintertarwe, wintergerst en winterrogge het middel toepassen vanaf de uitstoeling van het gewas (BBCH 20).

Bij gebruik in graszaadteelt het middel alleen toepassen in het jaar waarin geoogst gaat worden.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van het middel uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof propiconazool. Propiconazool behoort tot de triazolen. De Frac code is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.