

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 17 mei 2013 tot parallelle vergunning van het middel
Budget Milbectin EC, toelatingnummer 14117 N

A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insecten- en spintmijtbestrijdingsmiddel, door middel van een gewasbehandeling:

- a. In de teelt van snijbloemen onder glas
- b. In de teelt van potplanten onder glas
- c. In de buitenteelt van bloemisterijgewassen
 - i. Toepassing op percelen grenzend aan watergangen is uitsluitend toegestaan met inachtneming van de onderstaande maatregelen:
 - Standaard dop (50%) met 4,6 meter teeltvrije zone
 - 75% en 90% driftreducerende dop met 0,5 meter (standaard) teeltvrije zone;
- d. In de buitenteelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten
 - i. Toepassing op percelen grenzend aan watergangen is uitsluitend toegestaan in de teelt van spullen met inachtneming van de onderstaande maatregelen:
 - Teeltvrije zone van 8,9 meter met de axiaalspuit
 - ii. Toepassing op percelen grenzend aan watergangen is uitsluitend toegestaan in de teelt van de overige boomkwekerijgewassen en vaste planten met inachtneming van de onderstaande maatregelen:
 - Standaard dop (50%) met 4,8 meter teeltvrije zone
 - 75% driftreducerende dop met 1,5 meter (standaard) teeltvrije zone
 - 90% driftreducerende dop met 1,0 meter (standaard) teeltvrije zone
- e. In de buitenteelt van aardbeien tot aan de bloei en na de pluk en de vermeerdering van aardbeiplanten
 - i. Toepassing op percelen grenzend aan watergangen is uitsluitend toegestaan met inachtneming van de onderstaande maatregelen:
 - Standaard dop (50%) met 4,3 meter teeltvrije zone
 - 75% driftreducerende dop met 1,5 meter (standaard) teeltvrije zone
 - 90% driftreducerende dop met 1,0 meter (standaard) teeltvrije zone
- f. In de buitenteelt van dahliaknollen
 - i. Toepassing op percelen grenzend aan watergangen is uitsluitend toegestaan met inachtneming van de onderstaande maatregelen:
 - Standaard dop (50%) met 4,4 meter teeltvrije zone
 - 75% driftreducerende dop met 1,5 meter (standaard) teeltvrije zone
 - 90% driftreducerende dop met 1,0 meter (standaard) teeltvrije zone;

Schadelijk voor niet-doelwit arthropoden (roofmijten). Voorkom onnodige blootstelling.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

Budget Milbectin EC is een contact insecticide / acaricide.

Toepassingen

Snijbloemen onder glas, ter bestrijding van spintmijten (*Tetranychus spp.*).

Zodra de eerste mijten worden waargenomen, dient het middel d.m.v. een gewasbespuiting te worden toegepast. Indien nodig de behandeling na 7 dagen herhalen.

Dosering: 0,05% (50 ml middel per 100 liter water)

Snijbloemen onder glas, ter bestrijding van larven van de mineervlieg (*Liriomyza trifolii*, *L. huibrensis*, *L. bryoniae*).

Zodra de eerste mineergangen worden waargenomen. Indien nodig de behandeling na 7 dagen herhalen. Niet meer dan 3 blokken van behandelingen uitvoeren met maximaal 3 behandelingen per blok en een interval van minimaal 28 dagen tussen de blokken.

Dosering: 0,1% (100 ml middel per 100 liter water)

Potplanten onder glas, ter bestrijding van larven van de mineervlieg (*Liriomyza trifolii*, *L. huibrensis*, *L. bryoniae*).

Zodra de eerste mineergangen worden waargenomen. Indien nodig de behandeling na 7 dagen herhalen. Niet meer dan 3 blokken van behandelingen uitvoeren met maximaal 3 behandelingen per blok en een interval van minimaal 28 dagen tussen de blokken.

Dosering: 0,1% (100 ml middel per 100 liter water)

Bloemisterijgewassen, ter bestrijding van spintmijten (*Tetranychus spp.*)

Zodra de eerste mijten worden waargenomen, dient het middel door middel van een gewasbespuiting te worden toegepast. De behandeling na 7 tot 10 dagen herhalen.

Dosering: 0,05% of 50 ml middel per 100 liter water.

Boomkwekerijgewassen en vaste planten, ter bestrijding van spintmijten (*Tetranychus spp.*)

Zodra de eerste mijten worden waargenomen, dient het middel door middel van een gewasbespuiting te worden toegepast. De behandeling na 7 tot 10 dagen herhalen.

Dosering: 0,05% of 50 ml middel per 100 liter water.

Aardbeien tot aan de bloei en na de pluk en de vermeerdering van aardbeiplanten, ter bestrijding van spintmijten (*Tetranychus spp.*)

Zodra de eerste mijten worden waargenomen, dient het middel door middel van een gewasbespuiting te worden toegepast. De behandeling na 7 tot 10 dagen herhalen.

Dosering: 0,05% of 50 ml middel per 100 liter water.

Knollenteelt van dahlia, ter bestrijding van spintmijten (*Tetranychus spp.*)

Zodra de eerste mijten worden waargenomen, dient het middel door middel van een gewasbespuiting te worden toegepast. De behandeling na 7 tot 10 dagen herhalen.

Dosering: 0,05% of 50 ml middel per 100 liter water.