

Actueel WG van het middel Turex WG, 15039 N

W.1

17 juli 2020

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Witlof (pennenteelt)	Rupsen	1 kg/ha	1 kg/ha	3 per 12 maanden	3 kg/ha per 12 maanden	7
Cichorei	Rupsen	1 kg/ha	1 kg/ha	3 per 12 maanden	3 kg/ha per 12 maanden	7
Druif (onbedekte teelt)	Rupsen	0,25-1 kg/ha**	1 kg/ha	3 per 12 maanden	2,25 kg/ha per 12 maanden	7
Bladgroenten	Rupsen	1 kg/ha	1 kg/ha	3 per 12 maanden	3 kg/ha per 12 maanden	7
Peulgroenten m.u.v. pronkboon	Rupsen	1 kg/ha	1 kg/ha	3 per 12 maanden	3 kg/ha per 12 maanden	7
Vruchtgroenten (bedekte teelt)	Rupsen	0,08% (1 kg in 1200 liter water)	1 kg/ha	6 per 12 maanden	6 kg/ha per 12 maanden	7
Koolgewassen	Rupsen	1 kg/ha	1 kg/ha	3 per 12 maanden	3 kg/ha per 12 maanden	7
Wortel- en knolgewassen (onbedekte teelt)	Rupsen ^{1,2,3,4,5,6}	1 kg/ha	1 kg/ha	3 per 12 maanden	3 kg/ha per 12 maanden	7
Wortel- en knolgewassen (bedekte teelt)	Rupsen ¹	1 kg/ha	1 kg/ha	3 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	3 kg/ha per teeltcyclus, 6 kg/ha per 12	7

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
					maanden	
Stengelgroenten	Rupsen	1 kg/ha	1 kg/ha	3 per 12 maanden	3 kg/ha per 12 maanden	7
Aromatische kruidgewassen	Rupsen	1 kg/ha	1 kg/ha	3 per 12 maanden	3 kg/ha per 12 maanden	7
Sierteeltgewassen m.u.v. moeras- en waterplanten	Rupsen 3,6,7,8,9,10,11,12	0,05-0,1% (50-100 g middel per 100 liter water)	1 kg/ha	6 per teeltcyclus, 36 per 12 maanden	6 kg/ha per teeltcyclus, 36 kg/ha per 12 maanden	7
Openbaar groen	Rupsen 3,8,9,10,11,12,13	0,05-0,1% (50-100 g middel per 100 liter water)	1 kg/ha	3 per 12 maanden	3 kg/ha per 12 maanden	7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** Dosering is afhankelijk van het gewasstadium.

¹ koolmot (*Plutella xylostella*)

² late koolmot (*Evergestis forficalis*)

³ koolwitje (*Pieris* spp.)

⁴ gamma-uil (*Autographa gamma*)

⁵ kooluil (*Mamestra brassicae*)

⁶ *Plusia* spp.

⁷ *Mamestra* spp.

⁸ bastaardsatijnvlinder (*Euproctis chrysorrhoea*)

⁹ satijnvlinder (*Leucoma salicis*)

¹⁰ plakker (*Lymantria dispar*)

¹¹ ringelrupsvlinder (*Malacosoma neustria*)

¹² stippel- of spinselmot (*Yponomeuta* spp.)

¹³ kleine wintervlinder (*Operophtera brumata*)

Het gebruik in de teelt van aardbei en bessen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbei	Rupsen ^{1,4,6}	1 kg/ha	3	3 kg/ha	7
Bessen	Rupsen ¹³	1 kg/ha	3	3 kg/ha	7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ koolmot (*Plutella xylostella*)

⁴ gamma-uil (*Autographa gamma*)

⁶ *Plusia* spp.

¹³ kleine wintervlinder (*Operophtera brumata*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van druif het middel toepassen in 400 tot 1600 liter water per ha.

In de teelt van aardbei het middel toepassen in 1000-2000 liter water per ha.

In de teelt van bessen het middel toepassen in maximaal 1000 liter water per ha.

Het middel toepassen op de eitjes of op rupsen in een jong ontwikkelingsstadium.

De spuitvloeistof dient continu geroerd te worden.

Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

De gewasveiligheid van het middel in de wintermaanden is voor de bedekte teelt van bladgroenten niet onderbouwd. Voer een proefbespuiting uit voordat het middel in de bedekte teelt van bladgroenten op grote schaal toegepast wordt.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof *Bacillus thuringiensis*. De Irac code is 11A. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.