

Actueel WG van het middel Kumar

**W.1**

11 maart 2022

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassings-voorwaarden.

**Toepassingsvoorwaarden:**

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Vruchtbomenteelt en vruchtbomenonderstammen van appel (onbedekte teelt)	Schurft <sup>1</sup>	5 kg/ha	8 per 12 maanden	7	-
Wortelen (onbedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>2</sup> Alternaria <sup>3</sup>	3 kg/ha	8 per 12 maanden	7	1

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

<sup>1</sup> Schurft (*Venturia inaequalis*)

<sup>2</sup> Echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)

<sup>3</sup> Alternaria (*Alternaria dauci*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus	Veiligheidstermijn in dagen
Voederbiet	Echte meeldauw <sup>1</sup>	3 kg/ha	8 per 12 maanden	7	24 kg/ha	1
Wintergerst	Echte meeldauw <sup>2</sup> , Fusarium <sup>3</sup>	5 kg/ha	2 per 12 maanden	7	10 kg/ha	1
Winterrogge	Echte meeldauw <sup>2</sup> , Fusarium <sup>3</sup>	5 kg/ha	2 per 12 maanden	7	10 kg/ha	1
Triticale	Echte meeldauw <sup>2</sup> , Fusarium <sup>3</sup>	5 kg/ha	2 per 12 maanden	7	10 kg/ha	1
Spelt	Echte meeldauw <sup>2</sup> , Fusarium <sup>3</sup>	5 kg/ha	2 per 12 maanden	7	10 kg/ha	1
Kanariezaad	Echte meeldauw <sup>2</sup> , Fusarium <sup>3</sup>	5 kg/ha	2 per 12 maanden	7	10 kg/ha	1
Zomerrogge	Echte meeldauw <sup>2</sup> , Fusarium <sup>3</sup>	5 kg/ha	2 per 12 maanden	7	10 kg/ha	1
Haver	Echte meeldauw <sup>2</sup> , Fusarium <sup>3</sup>	5 kg/ha	2 per 12 maanden	7	10 kg/ha	1
Oliehoudende zaden	Echte meeldauw <sup>2</sup>	3 kg/ha	8 per 12 maanden	7	24 kg/ha	1
Vezelgewassen	Echte meeldauw <sup>4</sup>	3 kg/ha	8 per 12 maanden	7	24 kg/ha	1
Witlof (pennenteelt)	Echte meeldauw <sup>5</sup>	3 kg/ha	8 per 12 maanden	7	24 kg/ha	1
Cichorei	Echte meeldauw <sup>5</sup>	3 kg/ha	8 per 12 maanden	7	24 kg/ha	1

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus	Veiligheidsstermijn in dagen
Hop	Echte meeldauw <sup>6</sup>	3 kg/ha	8 per 12 maanden	7	24 kg/ha	1
Sla; Lactuca spp. (onbedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>5</sup> , valse meeldauw <sup>7</sup>	3 kg/ha	8 per 12 maanden	7	24 kg/ha	1
Andijvie (onbedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>5</sup> , valse meeldauw <sup>7</sup>	3 kg/ha	8 per 12 maanden	7	24 kg/ha	1
Spinazie-achtigen (onbedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>5</sup> , valse meeldauw <sup>7</sup>	3 kg/ha	8 per 12 maanden	7	24 kg/ha	1
Boon met peul (onbedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>8,9</sup>	3 kg/ha	8 per 12 maanden	7	24 kg/ha	1
Boon zonder peul	Echte meeldauw <sup>8,9</sup>	3 kg/ha	8 per 12 maanden	7	24 kg/ha	1
Erwt met peul (onbedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>8,9</sup>	3 kg/ha	8 per 12 maanden	7	24 kg/ha	1
Erwt zonder peul	Echte meeldauw <sup>8,9</sup>	3 kg/ha	8 per 12 maanden	7	24 kg/ha	1
Sluitkool	Echte meeldauw <sup>5</sup> , valse meeldauw <sup>10</sup>	3 kg/ha	8 per 12 maanden	7	24 kg/ha	1
Spruitkool	Echte meeldauw <sup>5</sup> , valse meeldauw <sup>10</sup>	3 kg/ha	8 per 12 maanden	7	24 kg/ha	1
Bloemkool	Echte meeldauw <sup>5</sup> , valse meeldauw <sup>10</sup>	3 kg/ha	8 per 12 maanden	7	24 kg/ha	1
Broccoli	Echte meeldauw <sup>5</sup> , valse meeldauw <sup>10</sup>	3 kg/ha	8 per 12 maanden	7	24 kg/ha	1

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus	Veiligheidstermijn in dagen
Bladkoolachtigen (onbedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>5</sup> , valse meeldauw <sup>10</sup>	3 kg/ha	8 per 12 maanden	7	24 kg/ha	1
Stengelkool	Echte meeldauw <sup>5</sup> , valse meeldauw <sup>10</sup>	3 kg/ha	8 per 12 maanden	7	24 kg/ha	1
Wortel- en knolgewassen m.u.v. wortelen (onbedekte teelt)	Echte meeldauw <sup>11</sup>	3 kg/ha	8 per 12 maanden	7	24 kg/ha	1
Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt)	Grauwe Schimmel <sup>12</sup>	3 kg/ha	4 per 12 maanden	7	12 kg/ha	-

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

<sup>1</sup> Echte meeldauw (*Erysiphe betae*)

<sup>2</sup> Echte meeldauw (*Blumeria graminis*)

<sup>3</sup> Fusarium (*Fusarium spp*)

<sup>4</sup> Echte meeldauw (*Oidium spp*)

<sup>5</sup> Echte meeldauw (*Erysiphe cichoracearum*)

<sup>6</sup> Echte meeldauw (*Podosphaera macularis*)

<sup>7</sup> Valse meeldauw (*Bremia spp.*)

<sup>3</sup> Echte meeldauw (*Erysiphe pisi*)

<sup>9</sup> Echte meeldauw (*Sphaerotheca fuliginea*)

<sup>10</sup> Valse meeldauw (*Hyaloperonospora brassicae*)

<sup>11</sup> Echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)

<sup>12</sup> Grauwe schimmel (*Botrytis spp.*)

Toelatingsnummer 16150 N

### **Overige toepassingsvoorwaarden**

In de teelt van bloembol en bloemknolgewassen toepassen na de bloei of koppen bij milde/lage ziektedruk.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.