

30 augustus 2019

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
wintertarwe	bruine roest ¹ gele roest ² meeldauw ³ gele bladvlekkenziekte ⁴ bladvlekkenziekte ⁵	1 L/ha	2	21	35
wintergerst	meeldauw ³ bladvlekkenziekte ^{6,7} netvlekkenziekte ⁸	1 L/ha	2	21	35
winterrogge	bruine roest ¹ bladvlekkenziekte ⁶	1 L/ha	2	21	35
triticale	bruine roest ¹ gele roest ² meeldauw ³ gele bladvlekkenziekte ⁴ bladvlekkenziekte ⁵	1 L/ha	2	21	35
spelt	bruine roest ¹ gele roest ² meeldauw ³ gele bladvlekkenziekte ⁴	1 L/ha	2	21	35

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
	bladvlekkenziekte ⁵				
zomertarwe	bruine roest ¹ gele roest ² meeldauw ³ gele bladvlekkenziekte ⁴ bladvlekkenziekte ⁵	1 L/ha	2	21	35
zomergerst	meeldauw ³ bladvlekkenziekte ^{6,7} netvlekkenziekte ⁸	1 L/ha	2	21	35
zomerrogge	bruine roest ¹ bladvlekkenziekte ⁶	1 l/ha	2	21	35

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen

¹ bruine roest (*Puccinia recondita*)

² gele roest (*Puccinia striiformis*)

³ meeldauw (*Erysiphe graminis*)

⁴ gele bladvlekkenziekte (DTR) (*Pyrenophora tritici-repentis*)

⁵ bladvlekkenziekte (*Septoria tritici* en *Septoria nodorum*)

⁶ bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

⁷ bladvlekkenziekte (*Ramularia collo-cygni*)

⁸ netvlekkenziekte (*Pyrenophora teres*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

In wintertarwe, zomertarwe, triticale, winterrogge, zomerrogge en spelt een behandeling uitvoeren in de periode vanaf einde uitstoeling tot aan het einde van de bloei (BBCH 30 - 69).

14245 N

In wintergerst en zomergerst een behandeling uitvoeren in de periode vanaf einde uitstoeling tot aan het einde van de aarvorming (BBCH 30 - 59).

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen epoxiconazole en isopyrazam. Epoxiconazole behoort tot de triazolen. De FRAC code is 3. Isopyrazam behoort tot de pyrazole-carboxamiden. De FRAC code is 7. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling.

In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.