

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 6 december 2013 tot herregistratie van de toelating van het middel Mesurol 500 SC, toelatingnummer 11720 N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden
Courgette (niet grondgebonden bedekte teelt)	Na oogst behandeling	Trips ^{1,2} bladluis ³	0,1% (100 ml per 100 liter)	0,5 l/ha	1
Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Trips ^{1,2,4} bladluis ³	0,1% (100 ml per 100 liter)	0,5 l/ha	1
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Trips ^{1,2} bladluis ³	0,1% (100 ml per 100 liter)	0,5 l/ha	1

- 1 Californische trips (*Frankliniella occidentalis*)
- 2 Tabakstrips (*Thrips tabaci*)
- 3 Katoenluis (*Aphis gossypii*)
- 4 Gladiolentrips (*Thrips simplex*)

Toepassingsvoorwaarden

Gevaarlijk voor bijen. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen door bijvoorbeeld alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden en bestuivers in kassen. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Gewasverdraagzaamheid

Indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden, teneinde de verdraagzaamheid van het gewas te testen en na te gaan of geen onaanvaardbaar zichtbaar residu optreedt.