

Actueel WG van het middel SIRENA

22 april 2022

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel of groeiregulator door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme/doel groeiregulatie	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Wintertarwe	Als schimmelbestrijdingsmiddel d.m.v. een gewasbehandeling	Bladvlekkenziekten ¹ , bruine roest ²	1,0 l/ha *	1	1,5 l/ha	-
		Fusarium ³	1,5 l/ha	1		-
Tritcale	Als schimmelbestrijdingsmiddel d.m.v. een gewasbehandeling	Bladvlekkenziekten ¹ , bruine roest ²	1,0 l/ha *	1	1.0 l/ha	-
Spelt	Als schimmelbestrijdingsmiddel d.m.v. een gewasbehandeling	Bladvlekkenziekten ¹ , bruine roest ²	1,0 l/ha *	1	1.0 l/ha	-
Zomertarwe	Als schimmelbestrijdingsmiddel d.m.v. een gewasbehandeling	Bladvlekkenziekten ¹ , bruine roest ²	1,0 l/ha *	1	1,5 l/ha	-
		Fusarium ³	1,5 l/ha	1		-
Koolzaad	Als schimmelbestrijdingsmiddel	Wortelhals en stengelaantasting ⁴	1,5 l/ha	2	3,0 l/ha	120 dagen

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme/doel groeiregulatie	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
	el of groeiregulator d.m.v. een gewasbehandeling	Verbetering stevigheid en vermindering legeringrisico	1,5 l/ha	1		-

¹ *Septoria tritici*, *Septoria nodorum* ² *Puccinia recondita* f.sp *tritici* ³ *Fusarium* spp ⁴ *Phoma lingam*

* in combinatie met een daarvoor toegelaten middel

Het gebruik op greens van golfterreinen is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Nederlandse Golf Federatie. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker

Het gebruik in de graszodenteelt is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009.. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden
Graszodenteelt	Als schimmelbestrijdingsmiddel d.m.v. een gewasbehandeling	<i>Fusarium</i> ¹ , Bladvlekkenziekte ² , kroonroest ³	1,5 l/ha	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha per teeltcyclus
Greens van golfterreinen	Als schimmelbestrijdingsmiddel d.m.v. een gewasbehandeling	<i>Fusarium</i> ¹ , Bladvlekkenziekte ² , kroonroest ³	1,5 l/ha	1 per 12 maanden	1,5 l/ha per 12 maanden

¹ *Microdochium nivale*, *Fusarium* spp ² *Drechslera* spp ³ *Puccinia coronata*

Toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing op perceelsranden die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen wanneer het middel eenmaal wordt toegepast of van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen wanneer het middel tweemaal wordt toegepast.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof metconazool. Metconazole behoort tot de triazolen. De Frac code is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.