

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 5 oktober 2012 tot wijziging van de toelating van het middel Mundial, toelatingnummer 12802 N

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik voor de behandeling van zaden, ten behoeve van de

- a. teelt van Chinese broccoli, Chinese kool, paksoi, amsoi, choisum, comatsuna en koolrabi (bedekte opkweek);
- b. teelt van bloemkool, broccoli en spruitkool;
- c. teelt van zaaiui (m.u.v picklers);
- d. teelt van prei (m.u.v de grondgebonden opkweek van prei).

Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het voerend is ondergewerkt.

Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

De toepasser dient de afnemer van zaden en/of planten er schriftelijk van op de hoogte te stellen dat bladluizen zodanig bestreden moeten worden dat er geen honingdauw wordt gevormd waar bijen op af kunnen komen.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

Mundial is een vloeibaar middel voor de behandeling van zaden ter voorkoming van schade door insecten. Het middel dient te worden toegepast als coating met de daarvoor gebruikelijke ontsmettingsmachines, of dient tijdens het zaaien door middel van een precisie druppelbehandeling op de zaden te worden gebracht zoals bv bij PHYTO-DRIP® . Behandeling van overjarig zaad of partijen met slechte kiemkracht wordt ontraden.

Toepassingen

Zaad voor de teelt van Chinese kool, Chinese broccoli, paksoi, amsoi, choisum, comatsuna en koolrabi (bedekte opkweek), ter bestrijding van de larven van de koolvlieg (*Delia brassicae*)

Met de behandeling wordt plantuitval, veroorzaakt door vreterij van de made van de koolvlieg tegengegaan.

Dosering: 25 ml middel per 100.000 zaden.

Zaad voor de teelt van bloemkool, broccoli en spruitkool, ter bestrijding van de larven van de koolvlieg (*Delia brassicae*)

Met de behandeling wordt plantuitval, veroorzaakt door vreterij van de made van de koolvlieg tegengegaan.

Dosering: 25 ml middel per 100.000 zaden

Zaad voor de teelt van uien, ter bestrijding van de uienvlieg (*Delia antiqua*).

Met de behandeling wordt plantuitval, veroorzaakt door vreterij van de made van de uienvlieg tegengegaan.

Dosering: 50 ml middel per 250.000 zaden

Zaad voor de teelt van prei (m.u.v de bedekte grondgebonden opkweek van prei),

Dosering: 100 ml middel per 250.000 zaden

ter bestrijding van de made van de uienvlieg (*Delia antiqua*).

Met de behandeling wordt plantuitval, veroorzaakt door vreterij van de made van de uienvlieg tegengegaan.

ter bestrijding van tabakstrips (*Thrips tabaci*).

Met de behandeling wordt een aantasting van trips op het zaaibed tegengegaan. Na het uitplanten van de prei op het productieveld kan een aanvullende gewasbehandeling tegen tabakstrips noodzakelijk zijn.