

**HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN**

Actueel WG van het middel FOLY STAR 400 SC

**W.1**

4 augustus 2017

**A.****WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT**

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de teelt van consumptie-, zetmeel- en pootaardappelen.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

Om residuen boven de MRL voor dimethomorf in volggewassen te voorkomen, is een wachttermijn vereist van tenminste 120 dagen tussen laatste toepassing en zaaien of planten. Dit geldt voor alle volggewassen waarvoor een MRL lager dan 0,05 mg/kg geldt, met uitzondering van granen, waarvoor geen wachttermijn is vereist.

**Veiligheidstermijn**

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan 7 dagen.

**Resistentiemanagement**

Dit middel bevat de werkzame stoffen dimethomorf en fluazinam. Dimethomorf behoort tot de cinnamic zuren. De Frac code is 40. Fluazinam behoort tot de dinitroanilinen. De Frac code is 29. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

**B.****GEBRUIKSAANWIJZING****Toepassingen**

Consumptie-, zetmeel en pootaardappelen, ter voorkoming van aantasting door de aardappelziekte (*Phytophthora infestans*).

Het tijdstip van de eerste behandeling hangt af van de ontwikkeling van het gewas en het weer. Meestal wordt met de bespuiting begonnen als de planten elkaar in de rij beginnen te raken; afhankelijk van de weersomstandigheden en het ras dienen de behandelingen om de 7-14 dagen te worden herhaald.

**Dosering: 0,75 – 1,0 liter per ha**

De dosering is afhankelijk van het ras, groeistadium, ziektedruk en interval tussen de bespuitingen. Gebruik 0,75 l/ha bij een interval van 7 dagen en verhoog de dosering als het interval groter wordt. Gebruik voldoende water (minimaal 200 l/ha) om het gewas te bedekken. Vooral bij snelle loofgroei en bij hoge ziektedruk.

Indien in pootaardappelen virusziekten met minerale olie worden bestreden kan FOLYSTAR 400 SC niet worden gebruikt i.v.m. de kans op bladverkleuring.

13889 N

FOLYSTAR 400 SC niet vaker dan 4 keer per seizoen toepassen.