

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappelen	Aardappelziekte ¹	2,0 kg/ha	8	9 (voor sluiting van het gewas, BBCH 40)	7
				7 (vanaf sluiting van het gewas, BBCH 40)	
Uien	Valse meeldauw ²	2,0 kg/ha	6 toepassingen verdeeld over 2 blokken van 3 toepassingen	14** (voor begin bolvorming, BBCH 40) binnen blok	28
				7** (vanaf begin bolvorming, BBCH 40) binnen blok	
Sjalotten	Valse meeldauw ²	2,0 kg/ha	6 toepassingen verdeeld over 2 blokken van 3 toepassingen	14** (voor begin bolvorming, BBCH 40) binnen blok	28
				7 ** (vanaf begin bolvorming BBCH 40) binnen blok	

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** , Interval tussen twee blokken minimaal 30 dagen.

¹Aardappelziekte (*Phytophthora infestans*)

²Valse meeldauw (*Peronospora destructor*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 200-400 L water/hectare

Om de vogels te beschermen is toepassing in de teelt van zaaiuien, eerste en tweedejaars plantuien, zaaisjalotten, plantsjalotten, picklers en zilveruien, voor BBCH 40 (wanneer bolvorming begint) uitsluitend toegestaan indien een interval van 14 dagen tussen de toepassingen in acht wordt genomen. Vanaf gewasstadium BBCH 40 (begin van bolvorming) geldt een minimum interval van 7 dagen.

Om de vogels te beschermen is toepassing in de teelt van aardappelen vóór BBCH 40 (sluiting van het gewas) uitsluitend toegestaan indien een interval van ten minste 9 dagen tussen de toepassingen in acht wordt genomen. Vanaf gewasstadium BBCH 40 (sluiting van het gewas) geldt een minimum interval van 7 dagen.

Om niet-doelwitarthropoden te beschermen, is de toepassing in aardappelen uitsluitend toegestaan als gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% driftreducerende doppen.