

## HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

**BIJLAGE I** bij het wijzigingsbesluit van het middel Tanos,  
toelatingsnummer 12353 N

A.

### WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van consumptie-, fabrieks- en pootaardappelen, indien toegepast in een dosering van 0,6 kg/ha per toepassing met een maximum van 3 toepassingen.

Bij toepassing op percelen grenzend aan watergangen dient er gespoten te worden

- met inachtneming van het driftreducerend maatregelenpakket behorend bij de standaard driftarme dop zoals opgenomen in het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, waarbij de driftarme dop wordt vervangen door een 90% driftreducerende dop of
- met gebruik van luchtondersteuning en spuitdoppen met een driftreductiepercentage van minimaal 50% en een teeltvrije zone van 1 m.

Het is niet toegestaan dit middel door middel van een luchtvaartuig toe te passen.

### **Veiligheidstermijn**

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan 14 dagen.

B.

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### **Algemeen**

##### Werkingswijze en werkingsspectrum

Tanos is samengesteld uit 2 werkzame stoffen met een verschillende werkingwijze: famoxadone en cymoxanil. Famoxadone is een contact fungicide met een preventieve werking. Cymoxanil is een lokaal-systemisch fungicide met zowel een preventieve als curatieve werking.

##### Toepassingen

##### Consumptie-, fabrieks- en pootaardappelen, tegen *Phytophthora infestans*

Het tijdstip van de eerste bespuiting hangt af van de ziektedruk (aanwezigheid van een bron), de weersomstandigheden, het ras en de ontwikkeling van het gewas. De eerste bespuiting kan al nodig zijn kort na opkomst van het gewas. Daarna maximaal twee bespuitingen uitvoeren om de 5-10 dagen, afhankelijk van de ziektedruk, weersomstandigheden, ras en gewasontwikkeling. Het kortste interval hanteren in geval van hoge ziektedruk en/of snelle loofontwikkeling.

Tanos mag maximaal 3 keer worden toegepast aan het begin van het groeiseizoen, tot aan de bloei van het gewas. Daarna dient het gewas met een ander middel voldoende beschermd te zijn totdat blad en stengel volledig zijn afgestorven.

Tanos kan met name preventief ingezet worden. Reeds aanwezige, zichtbare infecties worden niet afdoende bestreden. Tanos mag dan ook in dergelijke situaties niet worden ingezet.

Dosering: 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> bespuiting 0,6 kg/ha

### Drift reducerende maatregelen

Het 'Lozingsbesluit open teelten en veehouderij' dient te worden gerespecteerd. Het is mogelijk dat hierin wijzigingen optreden.

*Voor Tanos geldt echter minimaal het volgende: Op het perceel dat met Tanos wordt behandeld dient langs watergangen een teeltvrije zone van 1,5 meter te worden gehanteerd vanaf de insteek van het talud tot aan het hart van de buitenste gewasrij. Daarnaast moeten binnen een zone van 14 meter vanaf de insteek van het talud (wettelijk erkende) driftreducerende doppen én kantdoppen worden gebruikt. De driftreducerende doppen dienen een minimale driftreductie van 90% te realiseren. Langs droge sloten hoeft geen teeltvrije zone te worden gehanteerd maar moet wel gebruik worden gemaakt van driftreducerende doppen. Indien gebruik wordt gemaakt van luchtondersteuning dan geldt een teeltvrije zone van 1,0 meter (niet langs droge sloten) en dienen driftreducerende doppen met een minimale driftreductie van 50% te worden gebruikt.*

### **Opmerkingen:**

#### Regenvastheid

Indien regen volgt binnen 2 uur na de toepassing, kan de werking verminderd worden. Daarna is Tanos goed regenvast. Dit komt door het feit dat cymoxanil grotendeels is opgenomen en dat famoxadone zich aan de waslaag heeft gehecht. In geval van extreem veel neerslag is het sterk aan te bevelen om de volgende bespuiting te vervroegen.

#### Hoeveelheid water

Tanos kan gebruikt worden in een volume van 150-400 l water/ha.

Wageningen, 19 augustus 2005