

**BIJLAGE I** bij het besluit d.d. 23 juni 2006 tot uitbreiding van de toelating van het middel Acanto, toelatingnummer 12432 N

A.  
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel, toegepast door middel van een gewasbehandeling, in de teelt van:

- a) wintertarwe en zomertarwe;
- b) wintergerst en zomergerst;
- c) graszaadgewassen.

Gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

**Veiligheidstermijn**

Behandelde percelen mogen niet tijdens en binnen 5 weken na toepassing worden beweoid of gemaaid ten behoeve van voederdoeleinden.

Het gebruik in graszaadgewassen is toegelaten op basis van een derden uitbreiding. Deze derden uitbreiding is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd.

B.  
GEBRUIKSAANWIJZING

**Algemeen**

De verpakking dient tweemaal nagespoeld te worden.

**Resistentiemanagement**

Acanto is een fungicide uit de chemische groep der strobilurinen. Bij deze groep is er kans op resistentie. Om het risico van het ontwikkelen of verschijnen van resistente stammen te verminderen dient het middel niet vaker dan twee keer per jaar te worden toegepast.

Winter- en zomertarwe, ter voorkoming van aantasting door bladziekten en aarziekten (zogenaamde afrijpingsziekten), veroorzaakt door bladvekkenziekte (*Septoria tritici*, *Septoria nodorum* en *Drechslera tritici repens*), bruine roest (*Puccinia recondita*), gele roest (*Puccinia striiformis*), meeldauw (*Erysiphe graminis*) en zwartschimmels (*Dematiaceae*).

Een behandeling uitvoeren in de periode vanaf het verschijnen van het vlagblad tot het in aar komen (Z39 – 59).

Indien reeds in de periode vanaf het begin van het schieten van het gewas tot het verschijnen van het vlagblad (Z32 – 39) meeldauw en/of bladvekkenziekte optreden, dan een eerste behandeling uitvoeren. Een aanvullende behandeling ter bestrijding van afrijpingsziekten uitvoeren in de periode vanaf het verschijnen van het vlagblad tot het in aar komen (Z39 – 59).

Dosering: 1 liter per ha.

Winter- en zomergerst, ter bestrijding van bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*), netvlekkenziekte (*Pyrenophora teres*), dwergroest (*Puccinia hordei*) en meeldauw (*Erysiphe graminis f.sp.hordei*).

Wanneer in de periode vanaf schieten van het gewas tot het in aar komen (Z32 – 59) aantasting wordt waargenomen een behandeling uitvoeren.

Dosering: 1 liter per ha

Graszaadgewassen, ter voorkoming en bestrijding van schimmelziekten in graszaadgewassen. Een behandeling uitvoeren kort voor de bloeiperiode. De behandeling eventueel na de bloei herhalen. Goede ervaringen zijn opgedaan met de bestrijding van zwarte roest (*Pucciniagraminis*) en zwartschimmels (*Dematiaceae*) in Engels raaigras.

Dosering: 1 liter per ha.